

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева»
(Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ОПОП
_____ С.Б. Носачев

«04» апреля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
фундаментальной и прикладной
химии

Л.А. Джигола
«04» апреля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА»

Составитель

Джигола Л.А., доцент, к.х.н., заведующая
кафедрой фундаментальной и прикладной химии;

Согласовано с работодателями:

Фидурова С.Н., заместитель начальника отдела
физико-химических исследований, Инженерно-
технический центр «Газпром добыча Астрахань»,
к.х.н.;
Лукин Н.В., директор, МБОУ г. Астрахани
«Лицей №2 им. В.Н. Разуваева»

Направление подготовки

**04.05.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ**

Квалификация (степень)

Химик. Преподаватель химии

Форма обучения

очная

Год приема

2024

Курс

5

Семестр

10

Астрахань – 2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Целями освоения дисциплины «Поверхностно-активные вещества» являются: формирование современных представлений о фундаментальных достижениях в изучении физико-химических свойств поверхностно-активных веществ, их влиянии на экологические системы.

1.2. Задачи освоения дисциплины: приобретение навыков решения конкретных физико-химических задач: качественное и количественное определение поверхностно-активных веществ, исследование процессов мицеллообразования; овладение студентами навыками и умениями работы с различными измерительными приборами и научным оборудованием, с современной вычислительной техникой; постановкой и проведением химического эксперимента, математической обработкой результатов наблюдений и теоретической трактовкой опытных данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Учебная дисциплина «ПАВ» относится к факультативным дисциплинам Ф.05.

Дисциплина встраивается в структуру ОПОП (фундаментальные дисциплины химии: неорганическая химия, аналитическая химия, органическая химия, высокомолекулярные соединения, химическая технология, физические и физико-химические методы исследования в химии, квантовая механика и квантовая химия, коллоидная химия, учебная практика, НИР, производственная (технологическая) практика) как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.

«Входные» знания к дисциплине: основные понятия и законы неорганической и органической химии, качественные и количественные методы определения веществ, физико-химические теории и законы; умения и опыт деятельности обучающегося: правила работы в химической лаборатории (правила техники безопасности, обращение с химическими веществами, правила взвешивания и т.п.), подготовка химической посуды и реактивов, умения проводить физические, химические и физико-химические исследования на оборудовании (работать на иономерах, рефрактометрах, спектрофотометрах, поляриметре, проводить титриметрические измерения); проводить аналитическую обработку эмпирических данных.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения, навыки, формируемые предшествующими учебными дисциплинами:

- «Аналитическая химия»

Знания: современные методы качественного и количественного определения химических веществ в воздухе, водных объектах и почве;

Умения: применять полученные знания в практической работе, направленной на решение конкретной задачи при контроле содержания вредных веществ в объектах окружающей среды (воздух, вода, почва);

Навыки: владеть методами анализа веществ загрязняющих воздух, воду, почву; математической обработкой эмпирических данных по изучению сорбционных процессов (изотермы сорбции, интегральные кинетические кривые).

- «Квантовая химия»

Знания: электронное и пространственное строение атомов и молекул и взаимосвязи строения молекул с физическими, физико-химическими свойствами, а также с биологиче-

ской активностью молекул;

Умения: выбирать метод расчета для конкретной химической задачи;

Навыки: владеть навыками вычисления электронного строения и энергии молекулы;

- «Неорганическая химия»

Знания: общие закономерности протекания химических реакций в растворах и твердой фазе, основы химической термодинамики и кинетики;

Умения: применять теоретические знания о строении, изменении состава и реакционной способности реагирующих веществ;

Навыки: владеть навыками химического эксперимента с учетом правил техники безопасности при использовании химических реагентов, анализа результатов опытов и формулирования обоснованных выводов

2.3. Последующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- производственная (преддипломная) практика.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки:

в) ПК-5. Способен проводить критический анализ полученных результатов и оценивать перспективы продолжения работ в выбранной области химии, химической технологии или смежных с химией науках.

Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		Знать (1)	Уметь (2)	Владеть (3)
ПК-5	ПК-5.1 Критически анализирует полученные результаты исследований в выбранной области химии, выявляет достоинства и недостатки;	- отдельные стадии исследования ПАВ при наличии общего плана исследования;	- выбирать технические средства и методы испытаний (из набора имеющихся) для решения поставленных задач НИР;	- методами количественного и качественного анализа ПАВ загрязняющих воздух, воду, почву;
	ПК-5.2 Готовит отдельные разделы отчетов по результатам НИР и НИОКР в	- современные методы определения ПАВ в воздухе, водных объектах и почве;	- готовить элементы документации, проекты планов и программ отдельных этапов НИР;	- методами регистрации и обработки результатов анализа с использованием современного программного обеспечения.

	<p>выбранной области химии;</p> <p>ПК-5.3 Формулирует рекомендации по продолжению исследования в выбранной области химии.</p>	<p>- место поверхнностно-активных веществ в ряду других естественных дисциплин, ее значение в жизни современного общества.</p> <p>Современные представления о фундаментальных достижениях в изучении строения и состояния поверхнностно-активных веществ, физико-химических свойств, методов определения и синтеза поверхнностно-активных веществ, областях применения.</p>	<p>- готовить объекты исследования.</p>	<p>- методиками анализа конкретных физико-химических задач:</p> <p>качественное и количественное определение поверхнностно-активных веществ, исследование процессов мицеллообразования; определение класса поверхнностно-активных веществ, критической концентрации мицеллообразования различными методами, поверхностного натяжение растворов поверхнностно-активных веществ.</p>
--	---	---	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной,очно-заочной и заочной форм обучения приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Трудоемкость отдельных видов учебной работы по формам обучения

Вид учебной и внеучебной работы	для очной формы обучения
Объем дисциплины в зачетных единицах	2
Объем дисциплины в академических часах	72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе (час.):	20
- занятия лекционного типа, в том числе:	-
- практическая подготовка (если предусмотрена)	-
- занятия семинарского типа (семинары, практические, лабораторные), в том числе:	20
- практическая подготовка (если предусмотрена)	-

Вид учебной и внеучебной работы	для очной формы обучения
- в ходе подготовки и защиты курсовой работы	-
- консультация (предэкзаменаціонная)	-
- промежуточная аттестация по дисциплине	-
Самостоятельная работа обучающихся (час.)	52
Форма промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен), семестр (ы)	зачет – 10 семестр

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и самостоятельной работы, для каждой формы обучения представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Структура и содержание дисциплины
для очной формы обучения

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Контактная работа, час.							Итого часов	Форма текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации [по семестрам]		
	Л		ПЗ		ЛР		КР / КП				
	Л	в т.ч. ПП	ПЗ	в т.ч. ПП	ЛР	в т.ч. ПП					
Семестр 10.											
Раздел 1. Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ. Области применения ПАВ.											
<i>Тема 1.1. Катионные ПАВ</i>		1					3	4	Устный опрос, Отчёт по лабораторной работе №1 Решение аналитических задач		
<i>Тема 1.2. Неионогенные ПАВ (нПАВ)</i>		1					3	4			
<i>Тема 1.3. Амфотерные ПАВ (АмПАВ)</i>		1					3	4			
<i>Тема 1.4. Анионоактивные ПАВ (АПАВ)</i>		1					3	4			
Раздел 2. Синтез ПАВ.											
<i>Тема 2.1. Анионные ПАВ</i>		1					3	4	Устный опрос, Отчёт по лабораторной работе №2		
<i>Тема 2.2. Неионогенные ПАВ</i>		1					3	4			
<i>Тема 2.3. Катионные ПАВ</i>		1					3	4			
<i>Тема 2.4. Амфотерные ПАВ</i>		1					3	4			
Раздел 3. Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ											
<i>Тема 3.1. Ионные ассоциаты ПАВ</i>		1					3	4	Устный опрос, Отчёт по		
<i>Тема 3.2. Трехкомпонентные</i>		1					3	4			

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Контактная работа, час.							СР, час.	Итого часов	Форма текущего контроля успеваемос- ти, форма промежуто- чной			
	Л		ПЗ		ЛР		КР / КП						
	Л	В т.ч. ПП	ПЗ	В т.ч. ПП	ЛР	В т.ч. ПП							
<i>соединения ПАВ</i>													
<i>Тема 3.3. Современные методы определения синтетических ПАВ</i>			1					3	4	лабораторн ой работе №3 Тест №1			
<i>Раздел 4. Гигиенические характеристики поверхностно-активных веществ</i>													
<i>Тема 4.1. Токсичность ПАВ</i>			1					3	4	Устный опрос, Отчёт по лабораторн ой работе №4 Решение аналитичес ких задач			
<i>Тема 4.2. Влияние ПАВ на организм человека и на объекты окружающей среды</i>			1					3	4				
<i>Раздел 5. Строение мицелл ПАВ.</i>													
<i>Тема 5.1. Дифильное строение молекул ПАВ</i>			1					3	4	Устный опрос, Отчёт по лабораторн ой работе №5 Решение аналитичес ких задач			
<i>Тема 5.2. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)</i>			1					3	4				
<i>Раздел 6. Поверхностные явления.</i>													
<i>Тема 6.1. Поверхностные явления и причины их возникновения</i>			1					3	4	Устный опрос Отчёт по лабораторн ой работе №6 Рейтингова я К.Р. №1			
<i>Тема 6.2. Поверхностное напряжение</i>			2					2	4				
<i>Тема 6.3. Методы измерения поверхностного напряжения</i>			2					2	4				
Консультации													
Контроль промежуточной аттестации										Зачёт			
ИТОГО за семестр:			20					52	72				
Итого за весь период			20					52	72				

Таблица 3. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых компетенций

Радел дисциплины	Кол-во часов	Код компетенции	общее количество компетенций
		ПК-5	
Раздел 1. Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ. Области применения ПАВ.			
Тема 1.1. Катионные ПАВ	4	+	1
Тема 1.2. Неионогенные ПАВ (нПАВ)	4	+	1
Тема 1.3. Амфотерные ПАВ (АмПАВ)	4	+	1
Тема 1.4. Анионоактивные ПАВ (АПАВ)	4	+	1
Раздел 2. Синтез ПАВ.			
Тема 2.1. Анионные ПАВ	4	+	1
Тема 2.2. Неионогенные ПАВ	4	+	1
Тема 2.3. Катионные ПАВ	4	+	1
Тема 2.4. Амфотерные ПАВ	4	+	1
Раздел 3. Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ			
Тема 3.1. Ионные ассоциаты ПАВ	4	+	1
Тема 3.2. Трехкомпонентные соединения ПАВ	4	+	1
Тема 3.3. Современные методы определения синтетических ПАВ	4	+	1
Раздел 4. Гигиенические характеристики поверхностью-активных веществ			
Тема 4.1. Токсичность ПАВ	4	+	1
Тема 4.2. Влияние ПАВ на организм человека и на объекты окружающей среды	4	+	1
Раздел 5. Строение мицелл ПАВ.			

<i>Тема 5.1. Дифильное строение молекул ПАВ</i>	4	+	1
<i>Тема 5.2. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)</i>	4	+	1
<i>Раздел 6. Поверхностные явления.</i>			
<i>Тема 6.1. Поверхностные явления и причины их возникновения</i>	4	+	1
<i>Тема 6.2. Поверхностное натяжение</i>	4	+	1
<i>Тема 6.3. Методы измерения поверхностного натяжения</i>	4	+	1
Итого	72		1

Краткое содержание учебной дисциплины

Раздел I. Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ. Применение ПАВ

Дифильное строение ПАВ. Понятие о гидрофильно-липофильном балансе. Поверхностная активность, поверхностное натяжение. Истинно растворимые (молекулярно-диспергированные) и колloidные ПАВ. Моющее действие ПАВ.

Тема 1.1. Катионные ПАВ

Азотсодержащие КПАВ: соли аминов,mono- и бисчетвертичные аммониевые основания с алкильными цепями алифатической и ароматической структур, четвертичные аммониевые основания с различными функциональными группами в гидрофобной цепи. Mono и бисчетвертичные аммониевые основания с атомом азота в гетероциклическом кольце. Полимерные КПАВ.

Тема 1.2. Неионогенные ПАВ (нПАВ)

Спирты – предельные и непредельные, первичные, вторичные, циклические. Карбоновые кислоты. Алкилфенолы и алкилнафтоловы. Амины, амиды, имидазолины. Меркаптаны и сульфамиды. Полимеры: этилен- и пропиленгликоли, алкилацетилгликоли. Эфиры фосфорной кислоты, эфиры пентаэритрита. Продукты конденсации глюкозидов с жирными спиртами, карбоновыми кислотами и оксидом этилена. Кремнийорганические ПАВ.

Тема 1.3. Амфотерные ПАВ (АмПАВ)

Алкиламинокарбоновые кислоты. Алкилбетаины. Производные алкиламидализолинов. Алкиламиноалкансульфоны, алкиламиноалкансульфаты. Способы получения АмПАВ.

Тема 1.4. Анионоактивные ПАВ (АПАВ)

Производные карбоновых кислот – мыла. Первичные и вторичные алкилсульфаты, алкилфенилэтилсульфаты, алкилциклогексилсульфаты. Алкил и алкиларилсульфонаты сложных эфиров моно- и дикарбоновых кислот, олефинсульфонаты. Сульфоэтоксилаты спиртов, карбоксийэтоксилаты карбоновых кислот, соли сульфатов непредельных кислот. Азотсодержащие АПАВ: амидосульфонаты, амиды сульфокарбоновых кислот, амидосульфаты, амидокарбоксилаты. Соли перфторированых карбоновых кислот, перфторированных сульфоацетатов, моно- и диалкилфосфатов и фосфонатов. Характеристики, определяющие применение ПАВ: поверхностная активность, структура адсорбционных слоев и объемные свойства растворов.

Раздел II. Синтез ПАВ

Тема 2.1. Анионные ПАВ

Получение солей высших жирных кислот. Омыление жиров. Основные стадии метода получения мыла: последовательное проведение омыления, высыпывание, шлифование мыла и доведение его до товарной формы. Синтез карбоновых кислот. Получение натриевых мыл из синтетических жирных кислот (СЖК). Соли сульфоэфиров первичных спиртов (первичные алкилсульфаты). Соли сульфоэфиров вторичных спиртов (вторичные алкилсульфаты). Алкиларилсульфонаты. Алкилсульфонаты. Азотсодержащие анионные ПАВ.

Тема 2.2. Неионогенные ПАВ Оксигенированные спирты. Оксигенирование спиртов. Оксигенированные алкилфенолы. Алкиламины.

Тема 2.3. Катионные ПАВ

Синтез КПАВ из первичных, вторичных и третичных аминов. Основной процесс синтеза четвертичных солей аммониевых оснований – кватернизация.

Тема 2.4. Амфотерные ПАВ

Алкиламинокарбоновые кислоты. Анионно ориентированные амфолитные ПАВ. Синтез N-(сульфоалкил)аминоацетатов $\text{ROOCCH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{SO}_3\text{Na}$. Получение натриевой соли диалкил-N- (2-сульфоэтил) аминодиацетатов $(\text{ROOCCH}_2)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{SO}_3\text{Na}$. Получение соли алкиламино-N-полиэтиленгликоловых эфиров N-этансульфокислоты. Получение натриевой соли диэфиров N-сульфоацетил-этилендиаминдиуксусной кислоты.

Раздел III. Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ

Тема 3.1. Ионные ассоциаты ПАВ

Ионные ассоциаты, образуемые ПАВ с различными органическими соединениями. Ионные ассоциаты, образуемые анионными красителями или анионными ПАВ с органическими соединениями, содержащими катионы (аминогликозидные антибиотики, азотсодержащий гетероциклы, тетрациклины, антрациклины и др.). Ионные ассоциаты, образуемые КПАВ с органическими сульфокислотами, солями карбоновых кислот, с анионными ПАВ. Спектральные характеристики анионных красителей и их ионных ассоциатов с КПАВ.

Тема 3.2. Трехкомпонентные соединения ПАВ

Трехкомпонентные соединения КПАВ, анионных органических аналитических реагентов и ионов металлов. Трехкомпонентные соединения ксиленового оранжевого, хромазурола-S, пирокатехинового фиолетового, метилтимолового синего и др. с солями четвертичных аммониевых оснований или солями цетилпиридиния и ионами редкоземельных элементов, циркония, бериллия, урана, кобальта, никеля, молибдена, ванадия, титана. Определение металлов фотометрическим, экстракционно-фотометрическим или сорбционно- фотометрическим методами.

Тема 3.3. Современные методы определения синтетических ПАВ

Современные методы определения синтетических ПАВ (СПАВ) в объектах окружающей среды. Определение катионных ПАВ в виде ионных ассоциатов с анионными красителями экстракционно-фотометрическим методом. Определение НПАВ в виде их соединений с роданидом кобальта. Определение АПАВ в виде их ионных ассоциатов с катионными красителями.

Раздел IV. Гигиенические характеристики поверхностно-активных веществ

Тема 4.1. Токсичность ПАВ

Острая токсичность детергентов. Нормы и дозы при различном поступлении в организм катионных, анионных, неионогенных поверхностно-активных веществ. Биологическое действие ПАВ при длительном поступлении в организм животных. Зависимость кожно-раздражающего действия детергентов от химического строения и технологии их производства. Пороговой концентрацией раздражающего действия различных ПАВ. Действие ПАВ на органы и системы органов.

Тема 4.2. Влияние ПАВ на организм человека и на объекты окружающей среды

Аллергенное действие ПАВ при различных путях поступления в организм. Аллергический эффект у катионных и у неионогенных ПАВ. Промежуточное положение анионных детергентов. Отдаленные последствия воздействия ПАВ на организм животных. Влияние ПАВ на организм человека. Влияние синтетических ПАВ на сурфактантную систему легких.

Возможное нарушение поверхностно-активными веществами экологогигиенического равновесия в условиях комплексного антропогенного загрязнения окружающей среды. Гигиеническое значение поверхностно-активных веществ в условиях загрязнения почвы химическими соединениями.

Раздел V. Строение мицелл ПАВ

Тема 5.1. Дифильное строение молекул ПАВ

Дифильное строение молекул поверхностно-активных веществ. Их способность образовывать ассоциаты коллоидных растворов и обратный процесс, при котором такие коллоиды переходят в дисперсное состояние, образуя молекулярные растворы. Факторы, влияющие на данные процессы: изменение концентрации веществ в молекулярной или коллоидной форме, температуры и ионной силы раствора. Типы мицелл, их строение, форма. Способность солюблизировать.

Тема 5.2. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)

Влияние концентрации ПАВ на свойства растворов. Способы определения критической концентрации мицеллообразования. Влияние длины углеводородной цепи молекул ПАВ на термодинамические параметры адсорбции и мицеллообразования в водных растворах.

Зависимость свойств растворов ПАВ, например, их адсорбционная способность, а также способность образовывать мицеллы, от числа метиленовых групп в углеводородной цепи этих ПАВ, заряда и объема полярных групп, а также от наличия и концентрации различных электролитов в растворах.

Раздел VI. Поверхностные явления

Тема 6.1. Поверхностные явления и причины их возникновения

Классификация поверхностных явлений через объединенное уравнение I и II начал термодинамики. Приращение поверхностной энергии в другие виды энергии. Геометрические параметры поверхности. Поверхностный слой жидкости и твердого тела. Поверхностная энергия Гиббса.

Тема 6.2. Поверхностное натяжение

Термодинамическое определение поверхностного натяжения. Физический смысл и силовое определение. Термодинамика поверхностных явлений. Методы описания термодинамики поверхностных явлений, их достоинства и недостатки. Полная удельная поверхностная энергия. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Температурный коэффициент поверхностного натяжения. Температурная зависимость поверхностного натяжения (σ). Зависимость энергетических параметров поверхности от полярности жидкостей. Правило П.А. Ребиндера для различных жидкостей. Влияние природы граничащих фаз на поверхностное натяжение. Правило Г.Н. Антонова. Зависимость поверхностного

натяжения раствора от природы и концентрации растворенных веществ. Изотермы поверхностного натяжения (3 типа). Уравнение Б.А. Шишковского (ПАВ).

Тема 6.3. Методы измерения поверхностного натяжения

Статические методы: метод Вильгельми, метод капилярного поднятия, метод лежачей капли. Полустатические методы: метод отрыва пластиинки, метод отрыва кольца, метод взвешивания или счета капель. Динамические методы. Сравнения трех типов методов. Самопроизвольные процессы в поверхностном слое.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных занятий по дисциплине «ПАВ»

Преподаватель должен активно непосредственно участвовать в учебном процессе и проводить подготовку к нему. Необходимость постоянной подготовки к семинарским и практическим занятиям обусловлена потребностью отражать современные подходы, взгляды, данные по темам и разделам. Проводя подготовку к учебному процессу необходимо изучать современные методические рекомендации, результаты научных исследований, новые технологии и т.д. При реализации различных видов учебной работы преподаватель должен использовать образовательные технологии: создание интерактивных презентаций, обучающие компьютерные программы, технологии развития мышления (эффективная лекция, таблицы, работа в группах и т.д.)

Практические занятия способствуют закреплению знаний, полученных студентами в ходе теоретического обучения и самостоятельной работы, формированию компетенций, навыков в получении информации, приобретению умений провести ее обработку и анализ, овладению навыками планирования, анализа и управления. Общее требование при разработке тематики практических таково - этот вид аудиторных занятий должен научить студента правильно оценить и предвидеть развитие ситуации, управлять ее формированием, владению методами анализа. На занятиях проводится отработка практических умений под контролем преподавателя. В конце каждого практического занятия преподаватель планирует 6-7 минут для подведения итогов. Он обращает внимание на то, как освоен учебный материал по теме в целом, анализирует типичные ошибки и недоработки студентов, акцентирует их внимание на значимость темы.

Во время практических и семинарских занятий используются словесные методы обучения, как беседа и дискуссия, что позволяет вовлекать в учебный процесс всех слушателей и стимулирует творческий потенциал обучающихся. Преподавателю необходимо иметь, для проведения практических и семинарских занятий, наглядные пособия – наборы таблиц по теме занятия, схемы и др. При подготовке к практическим и семинарским занятиям преподавателю необходимо знать план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, познакомиться с новыми публикациями по теме. В начале занятия преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. В ходе занятия следует дать возможность выступить всем желающим и предложить выступить тем слушателям, которые проявляют пассивность. Целесообразно, в ходе обсуждения учебных вопросов, задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем, а также поощрять выступление с места в виде кратких дополнений. В заключительной части практического занятия следует подвести итог: дать объективную оценку выступления слушателя и учебной группы в целом, раскрыть положительные стороны и недостатки проведения

занятия, ответить на вопросы, назвать тему очередного занятия и дать необходимые задания. После подведения итогов устраниТЬ недостатки, отмеченные преподавателем.

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины «ПАВ»

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для работы с первоисточниками.

В ходе практических занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

В случае возникновения вопросов они могут быть заданы преподавателю на форуме (moodle@asu.edu.ru).

К выполнению, оформлению и отчету по практическим работам предъявляются общие требования:

1. Цель и задачи исследования.
2. Краткое описание эксперимента: способы, методы, методики исследования и теоретические положения.
3. Законы, положения, математический аппарат, уравнения реакций. Результаты исследования и расчеты (уравнения должны быть приведены в общем виде и с подставленными данными). Результаты исследования и расчетов должны быть сведены в соответствующие таблицы. Статистическая обработка данных.
4. Графическая обработка экспериментальных данных: графики и схемы должны выполняться только на миллиметровой бумаге. На ось ординат наносится функция, на ось абсцисс – аргумент с указанием единиц измерения. На осях наносится шкала согласно выбранному масштабу. Единицы масштаба должны быть выбраны в соответствии точности отсчета при эксперименте. Координаты экспериментальной точки наносятся только на плоскости и отмечаются точкой. По экспериментальным точкам проводится усредняющая кривая. Выпавшие точки не используются, но показываются. Экспериментальные данные для построения градуировочного графика обрабатываются по методу наименьших квадратов. на миллиметровой бумаге изображены графически зависимости, полученные в ходе выполнения эксперимента (все выполняется только простым карандашом!). График для каждой системы оформляется на отдельном листе, масштаба А4 (или $\frac{1}{2}$ листа масштаба А4, более мелкие рисунки не допускаются!) с подробной подписью (Рис.1). Если для системы приводятся данные при нескольких температурах, они наносятся все на один график. В подписи указываются, условия получения данных (длина волны, размер кювет, какой температуре соответствуют нанесенные линии, концентрация анализируемых растворов и т.п.). Компьютерный вариант представления графиков не допускается! При работе с графиком для определения каких-либо величин, допускается построение на графике

дополнительных линий, однако расчеты, связанные с этими графиками, следует помещать в тексте работы, а не на координатной плоскости графика или рисунка. В подписи под рисунком должен стоять номер рисунка, название графика и расшифровка по номерам линий на графике. Желательно, чтобы на одном листе располагался один рисунок;

5. Анализ экспериментально полученных зависимостей.

6. Выводы.

Работа считается выполненной, если приведены все необходимые расчеты, построены изучаемые зависимости, приведены все структурные формулы изучаемых веществ и образуемых соединений, сделаны соответствующие выводы.

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся

для очной формы обучения		
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов	Формы работы
Раздел 1. Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ. Области применения ПАВ. Моно и бисчетвертичные аммониевые основания с атомом азота в гетероциклическом кольце. Полимерные КПАВ. Полимеры: этилен- и пропиленгликоли, алкилацетилгликоли. Эфиры фосфорной кислоты, эфиры пентаэритрита. Продукты конденсации глюкозидов с жирными спиртами, карбоновыми кислотами и оксидом этилена. Кремнийорганические ПАВ. Алкиламиноалкансульфонаты, алкиламиноалкансульфаты. Способы получения АмПАВ.	12	Отчет по лабораторным работам. Опрос. Решение аналитических задач
Раздел 2. Синтез ПАВ. Синтез ПАВ: Соли перфторированных карбоновых кислот, перфторированных сульфоацетатов, моно- и диалкилфосфатов и фосфонатов. Характеристики, определяющие применение ПАВ: поверхностная активность, структура адсорбционных слоев и объемные свойства растворов. Соли сульфоэфиров вторичных спиртов (вторичные алкилсульфаты). Алкиларилсульфонаты. Алкилсульфонаты. Азотсодержащие анионные ПАВ. Оксигенированные алкилфенолы. Алкиламины. Получение натриевой соли диэфиров N-сульфоацетил- этилендиаминдиуксусной кислоты.	12	Отчет по лабораторным работам. Опрос
Раздел 3. Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ Трехкомпонентные соединения КПАВ, анионных органических аналитических реагентов и ионов металлов. Трехкомпонентные соединения ксиленолового оранжевого, хромазурола-S, пирокатехинового фиолетового, метилтимолового синего и др. с солями четвертичных аммониевых оснований или солями цетилпиридиния и ионами редкоземельных элементов, циркония, бериллия, урана, кобальта, никеля, молибдена, ванадия, титана. Определение металлов фотометрическим, экстракционно-фотометрическим или сорбционно- фотометрическим методами.	9	Отчет по лабораторным работам. Опрос. Решение аналитической задачи. Подготовка к тестированию
Раздел 4. Гигиенические характеристики поверхности-	6	Отчет по

<p>активных веществ</p> <p>Токсикология ПАВ. Детергенты и их токсичность. Нормы и дозы при различном поступлении в организм катионных, анионных, неионогенных поверхностно-активных веществ. Биологическое действие ПАВ при длительном поступлении в организм животных. Кожно-раздражающее и аллергическое действие детергентов. Аллергенное действие ПАВ при различных путях поступления в организм. Аллергический эффект у катионных и у неионогенных ПАВ. Промежуточное положение анионных детергентов. Отдаленные последствия воздействия ПАВ на организм животных. Влияние ПАВ на организм человека. Влияние синтетических ПАВ на сурфактантную систему легких.</p> <p>Возможное нарушение поверхностно-активными веществами эколого-гигиенического равновесия в условиях комплексного антропогенного загрязнения окружающей среды. Гигиеническое значение поверхностно-активных веществ в условиях загрязнения почвы химическими соединениями.</p>		<p>лабораторным работам.</p> <p>Опрос</p> <p>Решение аналитической задачи</p>
<p>Раздел 5. Строение мицелл ПАВ.</p> <p>Способы определения критической концентрации мицеллообразования. Влияние длины углеводородной цепи молекул ПАВ на термодинамические параметры адсорбции и мицеллообразования в водных растворах.</p> <p>Зависимость свойств растворов ПАВ, например, их адсорбционная способность, а также способность образовывать мицеллы, от числа метиленовых групп в углеводородной цепи этих ПАВ, заряда и объема полярных групп, а также от наличия и концентрации различных электролитов в растворах. Моющее действие ПАВ.</p>	6	<p>Отчет по лабораторным работам.</p> <p>Решение аналитической задачи</p> <p>Опрос</p>
<p>Раздел 6. Поверхностные явления. Поверхностные явления и причины их возникновения. Классификация поверхностных явлений через объединенное уравнение I и II начал термодинамики. Приращение поверхностной энергии в другие виды энергии. Геометрические параметры поверхности. Поверхностный слой жидкости и твердого тела. Поверхностная энергия Гиббса.</p> <p>Поверхностное натяжение. Термодинамическое определение. Физический смысл и силовое определение. Термодинамика поверхностных явлений. Методы описания термодинамики поверхностных явлений, их достоинства и недостатки. Полная удельная поверхностная энергия. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Температурный коэффициент поверхностного натяжения. Температурная зависимость поверхностного натяжения (σ). Зависимость энергетических параметров поверхности от полярности жидкостей. Правило П.А. Ребиндера для различных жидкостей. Влияние природы граничащих фаз на поверхностное натяжение. Правило Г.Н. Антонова. Зависимость поверхностного натяжения раствора от природы и концентрации растворенных веществ. Изотермы поверхностного натяжения (3 типа). Уравнение Б.А. Шишковского (ПАВ). Методы измерения поверхностного натяжения. Статические методы: метод</p>	7	<p>Отчет по лабораторным работам</p> <p>Опрос.</p> <p>Решение аналитической задачи</p> <p>Опрос.</p> <p>Рейтинговая К.Р. №1</p>

Вильгельми, метод капилярного поднятия, метод лежачей капли. Полустатические методы: метод отрыва пластиинки, метод отрыва кольца, метод взвешивания или счета капель. Динамические методы. Сравнения трех типов методов. Самопроизвольные процессы в поверхностном слое.

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, выполняемые обучающимися самостоятельно.

В качестве письменных работ предлагается подготовка к собеседованию по вопросам, отчет по лабораторным работам и самостоятельное решение задач.

Перечень вопросов к устному опросу и зачету

Строение и свойства ПАВ

1. Какие классы веществ относят к поверхностно-активным веществам и почему? Какие вещества называются поверхностно-активными (ПАВ)? Приведите примеры.
2. Какое строение имеют ПАВ?
3. Как подразделяются ПАВ в зависимости от состояния?
4. Понятие гидрофильно-липофильного баланса. Как определяется, для чего это понятие введено?
5. Определение поверхностной активности для разных групп ПАВ.
6. В чем заключается моющее действие ПАВ?
7. Классификация ПАВ. Приведите примеры.
8. Чем определяются области применения ПАВ? Перечислите основные области применения ПАВ.

Синтез поверхностно-активных веществ

9. Синтез АПАВ. Соли высших жирных кислот.
10. Синтез АПАВ. Соли сульфоэфиров первичных и вторичных спиртов.
11. Синтез АПАВ. Алкиларилсульфонаты. Алкилсульфонаты.
12. Синтез АПАВ. Азотсодержащие анионные ПАВ.
13. Синтез неионогенных ПАВ. Оксигенированные спирты. Оксигенированные алкилфенолы
14. Синтез НПАВ. Алкиламины.
15. Синтез катионных поверхностно-активных веществ.
16. Синтез анионных поверхностно-активных веществ. Анионно ориентированные амфолитные ПАВ. Алкиламинокарбоновые кислоты. Приведите примеры.

Ассоциация ПАВ с красителями

17. Дайте определение понятию ионный ассоциат. Приведите примеры.
18. Какие ионные ассоциаты способны образовывать анионные ПАВ? Приведите примеры.
19. Какие ионные ассоциаты способны образовывать катионные ПАВ? Приведите примеры.
20. Назовите современные методы определения синтетических ПАВ (СПАВ) в объектах окружающей среды.
21. Расскажите об определении катионных ПАВ в виде ионных ассоциатов с анионными красителями экстракционно-фотометрическим методом.
22. Расскажите об определении НПАВ в виде их соединений с роданидом кобальта.
23. Расскажите об определении АПАВ в виде их ионных ассоциатов с катионными красителями.

Токсикология ПАВ. Моющее действие ПАВ

24. Какие вещества относят к детергентам? Чем обусловлена их токсичность?
25. Какие существуют нормы и дозы при различном поступлении в организм катионных, анионных, неионогенных поверхностно-активных веществ?
26. В чем заключается биологическое действие ПАВ при длительном поступлении в организм животных? Приведите примеры.
27. Имеется ли зависимость кожно-раздражающего и аллергического действия детергентов от химического строения и технологии их производства? В чем она проявляется?
28. В чем проявляется гигиеническое значение поверхностно-активных веществ в условиях зарязнения объектов окружающей среды?

Мицеллы ПАВ

29. Какие ПАВ образуют мицеллярные системы? От чего это зависит? Приведите примеры.
30. Какие типы мицелл могут образовать ПАВ? Каково их строение и форма?
31. Чем обусловлены свойства мицелл? Как это применяют на практике? Приведите примеры.
32. Объясните понятие критической концентрации мицеллообразования (ККМ).
33. От каких факторов зависит достижение ККМ? Приведите зависимости и примеры.
34. Какими физико-химическими методами можно определять ККМ? Приведите зависимости и примеры.
35. Как влияет длина углеводородной цепи молекул ПАВ на термодинамические параметры адсорбции и мицеллообразования в водных растворах?

Поверхностные явления

36. Какие явления относят к поверхностным?
37. Каковы причины возникновения поверхностных явлений?
38. Классификация поверхностных явлений через объединенное уравнение I и II начал термодинамики. Приращение поверхностной энергии в другие виды энергии.
39. Геометрические параметры поверхности. Поверхностный слой жидкости и твердого тела.
40. Поверхностная энергия Гиббса.
41. Поверхностное натяжение. Термодинамическое определение. Физический смысл и силовое определение.
42. Термодинамика поверхностных явлений. Методы описания термодинамики поверхностных явлений, их достоинства и недостатки.
43. Полная удельная поверхностная энергия. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Температурный коэффициент поверхностного натяжения.
44. Температурная зависимость поверхностного натяжения (σ).
45. Зависимость энергетических параметров поверхности от полярности жидкостей. Правило П.А. Ребиндера для различных жидкостей.
46. Влияние природы граничащих фаз на поверхностное натяжение. Правило Г.Н. Антонова.
47. Зависимость поверхностного натяжения раствора от природы и концентрации растворенных веществ. Изотермы поверхностного натяжения (3 типа). Уравнение Б.А. Шишковского (ПАВ).
48. Методы измерения поверхностного натяжения. Статические методы: метод Вильгельми, метод капилярного поднятия, метод лежачей капли.
49. Полустатистические методы: метод отрыва пластинки, метод отрыва кольца, метод взвешивания или счета капель.

50. Динамические методы. Сравнения трех типов методов.
51. Самопроизвольные процессы в поверхностном слое. Какие факторы определяют уменьшение поверхностной энергии (ΔG). В результате чего формируется структура поверхностного слоя?

Общие требования к выполнению, оформлению и отчету по лабораторным работам

1. Цель и задачи исследования.
2. Краткое описание эксперимента: способы, методы, методики исследования и теоретические положения.
3. Законы, положения, математический аппарат, уравнения реакций. Результаты исследования и расчеты (уравнения должны быть приведены в общем виде и с подставленными данными). Результаты исследования и расчетов должны быть сведены в соответствующие таблицы. Статистическая обработка данных.
4. Графическая обработка экспериментальных данных: графики и схемы должны выполняться только на миллиметровой бумаге. На ось ординат наносится функция, на ось абсцисс – аргумент с указанием единиц измерения. На осях наносится шкала согласно выбранному масштабу. Единицы масштаба должны быть выбраны в соответствии точности отсчета при эксперименте. Координаты экспериментальной точки наносятся только на плоскости и отмечаются точкой. По экспериментальным точкам проводится усредняющая кривая. Выпавшие точки не используются, но показываются. На листе, где выполнен график, должны быть указаны наименование графика (под графиком), условия, сноски. Экспериментальные данные для построения градуировочного графика обрабатываются по методу наименьших квадратов.
5. Анализ экспериментально полученных зависимостей.
6. Выводы.

Работа считается выполненной, если приведены все необходимые расчеты, построены изучаемые зависимости, приведены все структурные формулы изучаемых веществ и образуемых соединений, сделаны соответствующие выводы.

Примерный перечень тем лабораторных работ

Лабораторная работа № 1: «Изучение образования двухкомпонентных соединений – ионных ассоциатов между индикатором метиловым оранжевым и КПАВ».

Лабораторная работа № 2: «Изучение образования комплексных соединений между неионогенными поверхностно-активными веществами (НПАВ) с роданидом кобальта-аммония».

Лабораторная работа № 3: «Изучение образования комплексных соединений между анионными поверхностно-активными веществами (АПАВ) с метиленовым синим»

Лабораторная работа № 4: «Изучение поверхностного натяжения растворов методом отрыва кольца».

Лабораторная работа № 5: «Измерение поверхностного натяжения по методу отрывающейся капли».

Лабораторная работа № 6: «Изучение критической концентрации мицеллообразования анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) с катионными красителями»

Тема рейтинговой контрольной работы

К.Р. «Физико-химические свойства поверхностно-активных веществ»

Примерные варианты тестовых заданий для самостоятельной подготовки:

1. Поверхностно-активные вещества – это:

- а) вещества способные увеличивать поверхностное натяжение на границе раздела фаз;
- б) вещества, адсорбирующиеся положительно и вызывающие снижение поверхностного натяжения растворителя;
- в) вещества, не изменяющие концентрацию раствора.

2. Мерой способности снижать поверхностное натяжение воды является:

- а) поверхностное натяжение;
- б) поверхностная активность;
- в) граница раздела фаз.

3. Молекулы ПАВ имеют строение:

- а) монофильное;
- б) гетерофильное;
- в) дифильное.

4. Какие вещества можно отнести к анионным ПАВ?

- а) $\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_n\text{COOM}$;
- б) $\text{RC}_6\text{H}_4(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{SO}_3\text{M}$;
- в) $[\text{RR}'_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{NR}'_2\text{R}]^{2+}2\text{X}^-$;
- г) $\text{RO}(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{H}$;
- д) $\text{RNH}(\text{CH}_2)_n\text{COOH}$.

5. Какое минимальное количество атомов углерода должен содержать углеродный скелет, чтобы вещество проявляло поверхностную активность?

- а) 3;
- б) 5;
- в) 7;
- г) 8.

6. Для каких ПАВ характерно образование мицеллярных систем?

- а) неионогенных;
- б) амфолитных;
- в) ионогенных.

7. Характеристикой коллоидных поверхностно-активных веществ является:

- а) температура;
- б) концентрация ПАВ;
- в) критическая концентрация мицеллообразования.

8. Во сколько раз увеличивается поверхностная активность ПАВ с увеличением длины углеводородной цепи на одну метиленовую группу?

- а) в 1,5;
- б) в 2;
- в) в 3,2.

9. Расположите ПАВ в порядке уменьшения их раздражающей способности:

- а) анионные;
- б) катионные;
- в) неионные;

г) амфолитные.

10. Поверхностные явления наблюдаются:

- а) в объеме фаз;
- б) в газовой фазе;
- в) на поверхности раздела фаз.

11. Поверхностный слой обладает:

- а) внутренней границей;
- б) избытком энергии Гиббса;
- в) постоянной толщиной.

12. Поверхностное натяжение это частная производная от.....по изменению площади поверхности:

- а) энергии Гиббса;
- б) энергии Гельмгольца;
- в) затраченной работы;
- г) любого термодинамического потенциала.

13. Для описания термодинамики поверхностных явлений применяют методы:

- а) градуировочного графика;
- б) «слоя конечной толщины»;
- в) наименьших квадратов;
- г) избыточных величин Гиббса.

14. Найдите соответствие:

- а) к статическим методам измерения поверхностного натяжения относят;
- б) к полустатическим методам измерения поверхностного натяжения относят;
- в) к динамическим методам измерения поверхностного натяжения относят;
- г) метод отрыва кольца; д) метод капиллярных волн; е) метод Вильгельми;
- ж) метод взвешивания или счета капель; з) метод колеблющихся струй;
- и) метод максимального давления пузырька; к) метод лежащей капли; л) метод отрыва пластиинки;
- м) метод капиллярного поднятия.

15. Фотометрическое определение АПАВ основано на:

- а) экстракции хлороформом;
- б) осаждении ионного ассоциата;
- в) адсорбции;
- г) проточно-инжекционный метод анализа с флуориметрией.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, диспуты, дебаты, портфолио круглые столы и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

6.1. Образовательные технологии

Преподнесение теоретического материала осуществляется с помощью электронных средств обучения, подготовки к практическим занятиям по вопросам к темам разделов (написание конспектов, подготовка докладов или сообщений по ситуационным задачам) с использованием интерактивных досок, методического материала (схемы, таблицы и т.п.).

При освоении практикума студентам предлагается индивидуальная работа и (или) работа в малых группах, где каждый получает своё задание.

Практические работы выполняются студентами по индивидуальным графикам согласно методическим указаниям к лабораторным работам, составленным по единому плану: перечень вопросов для подготовки к лабораторным работам, сущность методики, методика проведения определения, список литературы.

Теоретические вопросы, касающиеся той или иной практической работы, готовятся студентами самостоятельно. Дополнительно для самостоятельного выполнения дается несколько задач для решения из учебника или практикума.

В лаборатории перед каждой работой преподавателем проводится допуск к практической работе в виде устного опроса студентов и проверкой домашнего задания (7-10 мин). Результаты практическо-лабораторной работы обрабатываются методом математической статистики. Оформляется отчет по работе. Результаты анализа и допуска к работе оцениваются преподавателем по БАРС.

Таблица 5. Образовательные технологии, используемые при реализации учебных занятий

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Форма учебного занятия		
	Лекция	Практическое занятие, семинар	Лабораторная работа
<i>Раздел 1. Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ. Области применения ПАВ.</i>			
<i>Тема 1.1. Катионные ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 1.2. Неионогенные ПАВ (нПАВ)</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 1.3. Амфотерные ПАВ (АмПАВ)</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 1.4. Анионоактивные ПАВ (АПАВ)</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических	Не предусмотрено

		заданий, тематические дискуссии	
Раздел 2. Синтез ПАВ			
<i>Тема 2.1. Анионные ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 2.2. Неионогенные ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 2.3. Катионные ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 2.4. Амфотерные ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
Раздел 3. Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ			
<i>Тема 3.1. Ионные ассоциаты ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 3.2. Трехкомпонентные соединения ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 3.3. Современные методы определения</i>	Не предусмотрено	Тематические дискуссии, анализ конкретных	Не предусмотрено

<i>синтетических ПАВ</i>		ситуаций	
<i>Раздел 4. Гигиенические характеристики поверхностно-активных веществ</i>			
<i>Тема 4.1. Токсичность ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 4.2. Влияние ПАВ на организм человека и на объекты окружающей среды</i>	Не предусмотрено	Тематические дискуссии, анализ конкретных ситуаций	Не предусмотрено
<i>Раздел 5. Строение мицелл ПАВ.</i>			
<i>Тема 5.1. Дифильное строение молекул ПАВ</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 5.2. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)</i>	Не предусмотрено	Тематические дискуссии, анализ конкретных ситуаций	Не предусмотрено
<i>Раздел 6. Поверхностные явления.</i>			
<i>Тема 6.1. Поверхностные явления и причины их возникновения</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 6.2. Поверхностное напряжение</i>	Не предусмотрено	Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии	Не предусмотрено
<i>Тема 6.3. Методы измерения поверхностного напряжения</i>	Не предусмотрено	Тематические дискуссии, анализ конкретных ситуаций	Не предусмотрено

Учебные занятия по дисциплине могут также проводиться с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) интерактивном взаимодействии обучающихся и преподавателя в режимах on-line и/или off-line в формах: видео-лекций, видеоконференции, собеседования в режиме чата, форума, чата в различных мессенджерах, выполнения виртуальных практических работ и др.

6.2. Информационные технологии

При реализации различных видов учебной и внеучебной работы используются:

- использование возможностей интернета в учебном процессе (рассылка заданий, предоставление выполненных работ, ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.);
- использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронные библиотеки, журналы и т.д.) как источников информации;
- использование возможностей электронной почты преподавателя;
- использование средств представления учебной информации (электронных учебных пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (традиционных) лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д.);
- использование виртуальной обучающей среды (*LMS Moodle «Электронное образование»*) или иных информационных систем, сервисов и мессенджеров.

6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

6.3.1. Программное обеспечение

Наименование программного обеспечения	Назначение
Adobe Reader	Программа для просмотра электронных документов
Платформа дистанционного обучения LMS Moodle	Виртуальная обучающая среда
Mozilla FireFox	Браузер
Microsoft Office 2013, Microsoft Office Project 2013, Microsoft Office Visio 2013	Пакет офисных программ
7-zip	Архиватор
Microsoft Windows 7 Professional	Операционная система
Kaspersky Endpoint Security	Средство антивирусной защиты
Google Chrome	Браузер
OpenOffice	Пакет офисных программ
Opera	Браузер
Paint .NET	Растровый графический редактор
VLC Player	Медиапроигрыватель
WinDjView	Программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu

6.3.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-систем». <https://library.asu.edu.ru>

2. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной генерации на электронной платформе ЭБС «Электронный читальный зал - БиблиоТех». <https://biblio.asu.edu.ru>

Учетная запись образовательного портала АГУ

(Регистрация в 905 аудитории. Пристой)

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента». Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Каталог в настоящее время содержит около 15000 наименований.

www.studentlibrary.ru

Регистрация с компьютеров АГУ

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «ПАВ» проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в разделе 3 настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется последовательным освоением дисциплин и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины - последовательным достижением результатов освоения содержательно связанных между собой разделов и тем.

Таблица 6. Соответствие изучаемых разделов, тем дисциплины, результатов обучения по дисциплине и оценочных средств

Контролируемый раздел, тема дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
Раздел 1. Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ. Области применения ПАВ.	ПК-5	Отчет по лабораторным работам. Вопросы для собеседования Задачи
Раздел 2. Синтез ПАВ.	ПК-5	Отчет по лабораторным работам. Вопросы для собеседования
Раздел 3. Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ	ПК-5	Отчет по лабораторным работам Вопросы для собеседования
Раздел 4. Гигиенические характеристики	ПК-5	Отчет по

поверхностно-активных веществ. Токсикология ПАВ.		лабораторным работам Вопросы для собеседования Тест1
Раздел 5. Строение мицелл ПАВ. Поверхностные явления. Причины возникновения. Термодинамика поверхностных явлений. Поверхностное натяжение. Изотермы. Методы определения. Моющее действие ПАВ	ПК-5	Вопросы для собеседования Отчет по лабораторным работам Задачи
Раздел 6. Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ	ПК-5	Вопросы для собеседования Отчет по лабораторным работам Рейтинговая К.Р. №1

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 7. Критерии оценивания результатов обучения в виде знаний

5 «отлично»	Демонстрирует глубокие знания теоретического материала, умение обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, правильно и аргументировано отвечать на вопросы, приводить примеры.
4 «хорошо»	Демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изложение, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя.
3 «удовлетворительно»	Демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, требующие наводящих вопросов преподавателя, допускает существование ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и формулировке выводов.
2 «неудовлетворительно»	Демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, не может привести примеры.

Таблица 8 - Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений

5 «отлично»	Демонстрирует способность применять знание теоретического материала при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы.
4 «хорошо»	Демонстрирует способность применять знание теоретического материала при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя.
3 «удовлетворительно»	Демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен применить знание теоретического материала при выполнении знаний, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов.

2 «неудовлетв орительно»	Не способен правильно выполнить задание.
--------------------------------	--

Критерии оценки тестовых заданий:

1. оценка «отлично» выставляется студенту, если дано не менее 90% правильных ответов (интервал от 90 до 100%);
2. оценка «хорошо» если дано не менее 70% правильных ответов (интервал от 70 до 89%);
3. оценка «удовлетворительно» если дано не менее 50% правильных ответов (интервал от 50 до 69%);
4. оценка «неудовлетворительно», если дано менее 50% правильных ответов.

Критерии оценки для практических работ

1. оценка «отлично» (90-100 баллов) выставляется студенту, если полностью выполнены общие требования к выполнению, оформлению и отчету по лабораторным работам, а именно:

- отчет по работе представлен не позднее двух недель после выполнения и/ или вовремя прикреплен на проверку в электронно-образовательном ресурсе **moodle.asu.edu.ru (по указанию преподавателя!)**;
- аккуратно (читаемо) оформлена работа (цель, оборудование, реагенты, ход работы, таблицы с результатами, графики, расчеты, уравнения реакций или схемы, статистическая обработка данных, выводы)
- обязательно продемонстрировать в работе используемый математический аппарат по теме выполняемой работы (обозначения, формулы, уравнения реакций, схемы и т.п.).
- на миллиметровой бумаге изображены графически зависимости, полученные в ходе выполнения эксперимента (все выполняется только простым карандашом!). График для каждой системы оформляется на отдельном листе, масштаба А4 (или $\frac{1}{2}$ листа масштаба А4, более мелкие рисунки не допускаются!) с подробной подрисунковой подписью (Рис.1). Если для системы приводятся данные при нескольких температурах, они наносятся все на один график. В подрисунковой подписи указываются, условия получения данных (длина волны, размер кювет, какой температуре соответствуют нанесенные линии, концентрация анализируемых растворов и т.п.). Компьютерный вариант представления графиков не допускается! При работе с графиком для определения каких-либо величин, допускается построение на графике дополнительных линий, однако расчеты, связанные с этими графиками, следует помещать в тексте работы, а не на координатной плоскости графика или рисунка. В подписи под рисунком должен стоять номер рисунка, название графика и расшифровка по номерам линий на графике. Желательно, чтобы на одном листе располагался один рисунок;
- ошибки и недочеты в расчетах отсутствуют, приведены размерности всех величин в системе единиц СИ;
- студентом правильно проведен анализ и оценка полученных результатов, представлена статистическая обработка полученных результатов, дано аргументированное обоснование найденному проценту ошибки в работе;
- студент правильно и аргументировано ответил письменно на все вопросы после лабораторной работы, а также безошибочно выполнен комплект задач по теме лабораторной работы (при наличии).

2. оценка «хорошо» (70-89 баллов) выставляется студенту, если полностью выполнены общие требования к выполнению, оформлению и отчету по лабораторным работам, **см. пункт 1.** Но в работе имеются не существенные замечания:

- не полное оформление, представлен не полностью математический аппарат, пропущены размерности величин;
- есть не критические замечания к оформлению и трактовке графиков;
- студент правильно и аргументировано ответил письменно на более 80-% всех вопросов после лабораторной работы, а также не менее 80-% правильно решенных задач по теме лабораторной работы (при наличии).

3. оценка «удовлетворительно» (60-69 баллов) выставляется студенту, если не полностью выполнены общие требования к выполнению, оформлению и отчету по лабораторным работам, **см. пункт 1**, а именно:

- отчет по работе представлен не вовремя (позднее двух недель после выполнения) и/ или не вовремя прикреплен на проверку в электронно-образовательном ресурсе **moodle.asu.edu.ru (по указанию преподавателя!)**;
- небрежное оформление, в работе частично представлен математический аппарат, пропущены размерности величин;
- есть критические замечания к оформлению и трактовке графиков;
- студентом или не дан, либо ошибочно проведен анализ и оценка полученных результатов, не проведена статистическая обработка полученных данных, нет разъяснений по рассчитанному проценту ошибки по полученным экспериментальным данным.
- Студент правильно и аргументировано ответил письменно на более 70-% всех вопросов после лабораторной работы, а также не менее 70-% правильно решенных задач по теме лабораторной работы (при наличии).

4. оценка «неудовлетворительно» (50-59 баллов) выставляется студенту если:

- отчет по работе представлен не вовремя (позднее двух недель после выполнения) и/ или не вовремя или вообще не прикреплен на проверку в электронно-образовательном ресурсе **moodle.asu.edu.ru (по указанию преподавателя!)** без уважительной причины;
- небрежное оформление, в работе не представлен математический аппарат, пропущены размерности величин;
- имеются грубые ошибки в оформлении и трактовке графиков, в расчетах и (или) уравнениях реакций;
- студентом не представлен анализ и оценка полученных результатов, не проведена статистическая обработка полученных данных, нет разъяснений по рассчитанному проценту ошибки по полученным экспериментальным данным.
- студент не ответил правильно письменно на менее 50-% всех вопросов после лабораторной работы, а также не выполнил правильно хотя бы 1 задачу из комплекса задач после лабораторной работы (при наличии).

5. оценка «неудовлетворительно», если студент не может правильно ответить на поставленные вопросы, не способен провести анализ и дать оценку полученным результатам.

7.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Раздел 1. «Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ» Области применения ПАВ»

1. Вопросы для обсуждения.

1. Какие классы веществ относят к поверхностно-активным веществам и почему? Какие вещества называются поверхностно-активными (ПАВ)? Приведите примеры.
2. Какое строение имеют ПАВ?

3. Как подразделяются ПАВ в зависимости от состояния?
4. Понятие гидрофильно-липофильного баланса. Как определяется, для чего это понятие введено?
5. Определение поверхностной активности для разных групп ПАВ.
6. В чем заключается моющее действие ПАВ?
7. Классификация ПАВ. Приведите примеры.
8. Чем определяются области применения ПАВ?
9. Перечислите основные области применения ПАВ.

2. Лабораторная работа № 1 «Изучение образования двухкомпонентных соединений – ионных ассоциатов между индикатором метиловым оранжевым и КПАВ».

Принцип метода. Изучается образование ионного ассоциата между индикатором метиловым оранжевым и КПАВ, экстрагирующегося хлороформом из водных растворов. Измеряемые концентрации находятся в пределах от 0,01 до 0,25 мг/м³. Без каких-либо изменений методика пригодна для определения любых КПАВ в воздухе, воде и вытяжках из почв.

Цель работы: найти коэффициенты уравнения, описывающего распределение КПАВ при 25 °С в системе «вода – хлороформ». Рассчитать количество вещества g, оставшееся в исходном растворе после n экстракций.

Аппаратура и реактивы. Фотоэлектролориметр любой системы с поглощением света от 440 до 490 нм и кюветой с толщиной слоя 1–2 см. Посуда стеклянная мерная, ГОСТ 1770-20292-74. Метиловый оранжевый, индикатор, 10⁻³ М водный раствор. Хлороформ, фармакопейный. Цитрат натрия, 0,1 М раствор. (Растворяют в воде 21,04 г лимонной кислоты и 200 см³ 1 М раствора гидроксида натрия в мерной колбе емкостью 1 дм³).

Буферный раствор. Смешивают 48 см³ 0,1 М раствора цитрата натрия и 51,6 см³ 0,1 М раствора хлороводородной кислоты.

Исходный стандартный раствор КПАВ, содержащий 10⁻³ М основного вещества в воде, готовят весовым способом.

Рабочий стандартный раствор КПАВ, содержащий 10⁻⁴ М, готовят разбавлением стандартного раствора.

Выполнение эксперимента

Градуировочный график. Для приготовления шкалы стандартов в 8 пробирок емкостью 10 см³ вносят 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 см³ рабочего стандартного раствора КПАВ, 2,0, 1,95, 1,9, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, и 1,0 см³ дистиллированной воды, по 1 см 10⁻³ М раствора метилового оранжевого и буферный раствор по 2 см³. Измеряют оптические плотности водных растворов ($A_1^0, A_2^0 \dots A_8^0$). Из всех пробирок экстрагируют хлороформом один раз порциями по 4 см³ ионный ассоциат КПАВ с метиловым оранжевым. Растворам дают отстояться. Экстракти отделяют и измеряют оптические плотности экстрактов ($A'_1, A'_2 \dots A'_8$) и водных систем при 440 (490) нм в кювете толщиной 1 или 2 см относительно нулевого раствора или воды ($A_1, A_2 \dots A_8$). Для обработки результатов повторяют работу.

Обработка результатов

Закон распределения: если в систему из двух не смешивающихся жидкостей ввести какое-либо вещество, способное растворяться как в одном, так и в другом растворителе, то после взбалтывания оно распределится определенным образом между слоями данных жидкостей. Соотношение равновесных концентраций распределяемого вещества в двух жидкостях при постоянной температуре является постоянной величиной

и не зависит от абсолютных и относительных количеств каждого из растворителей и распределяемого вещества.

$$C_1^n / C_2 = K_D - \text{закон распределения в общем виде,} \quad (1)$$

где C_1 – равновесная концентрация распределяющегося вещества в первой фазе, C_2 – равновесная концентрация распределяющегося вещества во второй фазе, $n = M_2 / M_1$; M_1 – средний молекулярный вес распределяющегося вещества в первой фазе, M_2 – средний молекулярный вес распределяющегося вещества во второй фазе, n вводится, т. к. в некоторых системах распределяющееся вещество вследствие диссоциации или ассоциации его молекул обладает неодинаковой средней величиной частиц в разных растворителях.

Прологарифмировав выражение 1, получим:

$$nlgC_1 - lgC_2 = lgK_D \quad \text{или} \quad lgC_2 = nlgC_1 - lgK_D \quad (2)$$

Уравнение 2 – это уравнение прямой, где тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс равен n , а отрезок, отсекаемый прямой по оси ординат равен lgK_D .

Закон распределения используется для количественной характеристики процесса экстрагирования веществ из растворов. Зная коэффициенты уравнения, описывающего распределение (n и K_D), можно рассчитать количество вещества g , оставшееся в исходном растворе после n экстракций:

$$g = g_0(KV_1 / KV_1 + V_2)^n, \quad (3)$$

где g_0 – первоначальное содержание экстрагируемого вещества в V_1 см³ раствора, г; V_2 – объем растворителя, которым производилось экстрагирование, см³.

Для нахождения коэффициентов уравнения, описывающего распределение (n и K_D), необходимо построить зависимость $lgA_1 - lg\Delta A_1$ (рис. 1), используя вместо концентраций значения оптических плотностей растворов, т.к. изменение оптической плотности прямо пропорционально изменению концентрации.




Рис. 1. График для нахождения коэффициентов уравнения, описывающего распределение (n и K_D)

Для построения необходимо рассчитать: $\Delta A_1 \dots \Delta A_8 = A'_1 - A_1$. Физический смысл величины ΔA – относительная плотность, соответствующая количеству КПАВ в экстракте; рассчитать $lgA_1 \dots lgA_8$, а также $lg\Delta A_1 \dots lg\Delta A_8$.

Определив графически коэффициенты уравнения, описывающего распределение (n и K_D), необходимо рассчитать количество вещества g , оставшееся в исходном растворе после n экстракций (3).

Для построения градуировочного графика для определения ПАВ строят зависимость оптических плотностей экстрактов ($A'_1, A'_2 \dots A'_8$) от концентрации ПАВ (рис. 2)




Рис. 2. Зависимость оптических плотностей экстрактов от концентрации ПАВ

Отчет по работе включает в себя название работы, основную идею этой работы, материалы, оборудование и методику выполнения. Полученные результаты представляют в виде таблиц и графиков. В конце отчета делается заключение.

3. Комплект задач (заданий) для практических занятий по дисциплине «Поверхностно-активные вещества»

Методические рекомендации к решению типовых задач Примеры решения типовых задач

1. Зависимость поверхностного натяжения водных растворов амилового спирта ($C_5H_{11}OH$) от концентрации при $25^{\circ}C$ выражается следующим образом:

Концентрация, кмоль/м ³	Поверхностное натяжение, мН/м
0	72,0
0,0019	70,4
0,0038	69,2
0,0075	66,7
0,0150	61,7
0,030	55,3
0,060	46,6
0,120	38,0

Определить графически поверхностный избыток амилового спирта из раствора с концентрацией 0,030 кмоль/м³.

Решение. Построим график, отражающий зависимость σ от c (рис. 1). Проведем касательную к кривой в точке, имеющей ординату 0,030 кмоль/м³. Тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс равен $\frac{d\sigma}{dc}$. Из графика находим:

$$\frac{d\sigma}{dc} = -\frac{37 \cdot 10^{-3}}{0,095} = -0,39 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кмоль}.$$

(Множитель 10^{-3} в числителе вводится в связи с тем, что поверхностное натяжение в таблице и на рис. 1 выражено в мН/м). По уравнению изотермы адсорбции Гиббса находим поверхностный избыток:

$$\Gamma = -\frac{0,030}{8,31 \cdot 10^3 \cdot 298} (-0,39) = 4,72 \cdot 10^{-9} \text{ кмоль/м}^2.$$




Рис. 1. Графический расчет $\frac{d\sigma}{dc}$ для поверхностного избытка амилового спирта.

2. Определить поверхностный избыток (кмоль/м²) при 10°C для раствора, содержащего 50 мг/дм³ пеларгоновой кислоты $C_8H_{17}COOH$, поверхностное натяжение исследуемого раствора $57,0 \cdot 10^{-3}$ н/м.

Решение. По приложению находим поверхностное натяжение воды $\sigma(H_2O)$ при 10°C : $\sigma(H_2O) = 74,22 \cdot 10^{-3}$ н/м.

Определяем концентрацию кислоты в растворе
 $C_2 = 0,05/158 = 3,2 \cdot 10^{-4}$ кмоль/м³;

$$C_1 = 0.$$

Уравнение изотермы адсорбции Гиббса для достаточно разбавленных растворов имеет вид: $\Gamma = -\frac{C}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{dc}$,

для приближенных расчетов $\frac{d\sigma}{dc}$ можно заменить на: $\frac{\Delta\sigma}{\Delta c} = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{c_2 - c_1}$,

$$\text{тогда } \Gamma = -\frac{c_2}{RT} \cdot \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{c_2 - c_1},$$

где Γ – величина адсорбции;

c – концентрация вещества, кмоль/м³;

R – газовая постоянная, Дж/кмоль · К;

T – температура, К;

$\frac{d\sigma}{dc}$ – изменение поверхностного натяжения раствора с концентрацией растворенного вещества при неизменной поверхности, Н/м.

σ_2 – поверхностное натяжение раствора, Н/м;

σ_1 – поверхностное натяжение чистого растворителя, Н/м.

Из полученного уравнения следует, что если $\frac{d\sigma}{dc} > 0$, то $\Gamma < 0$ (отрицательная адсорбция), а при $\frac{d\sigma}{dc} < 0, \Gamma > 0$ (положительная адсорбция).

При положительной адсорбции концентрация растворенного вещества больше в поверхностном слое, чем в глубине фазы, а $\sigma_2 < \sigma_1$.

Находим поверхностный избыток:

$$\Gamma = -\frac{3,2 \cdot 10^{-4}}{8,314 \cdot 10^3 \cdot 283} \cdot \frac{57,0 \cdot 10^{-3} - 74,22 \cdot 10^{-3}}{3,2 \cdot 10^{-4}} = 7,318 \cdot 10^{-9} \text{ кмоль/м}^2,$$

так как $\Gamma > 0$, то адсорбция положительна.

3. Найдите поверхностную активность валериановой кислоты на границе ее водного раствора с воздухом при $C = 0,01$ моль/дм³. Значения констант уравнения Шишковского: $a = 17,7$; $b = 19,72$.

Решение. Уравнение Шишковского имеет следующий вид:

$$\Delta\sigma = \sigma_{\text{воздух}} - \sigma_{\text{вода}} = b \cdot C / (1 + b \cdot C)$$

После дифференцирования получим уравнение:

$$-(d\sigma/dC) = a \cdot b / (1 + b \cdot C);$$

Используя полученное уравнение, рассчитаем поверхностную активность валериановой кислоты:

$$-(d\sigma/dC) = G = 17,7 \cdot 19,72 / (1 + 19,72 \cdot 0,01) = 294 \text{ эрг} \cdot \text{см}/\text{моль}.$$

4. Вычислите поверхностное натяжение толуола при 50°C, если при медленном выпускании его из сталагмометра масса 38 капель составила 1,486 г. При выпускании из того же сталагмометра воды при той же температуре масса 25 капель ее оказалась равной 2,657 г. Поверхностное натяжение воды при 50 °C равно 76,91·10⁻³ Н/м.

Решение. Для определения поверхностного натяжения толуола сталагмометрическим методом воспользуемся формулой:

$$\sigma(\text{толуол}) = \sigma(H_2O) \frac{n(\text{толуол}) \cdot m(\text{воды})}{m(\text{воды}) \cdot n(\text{толуол})},$$

где σ (толуола) и σ (H_2O) — поверхностное натяжение толуола и воды, Н/м; m (толуола) и m (H_2O) — массы капель толуола и воды, г или кг; n (толуола) и $n(H_2O)$ — число капель толуола и воды.

Подставив числовые значения, получим:

$$\sigma(\text{толуол}) = 76,91 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1,486 \cdot 25}{2,657 \cdot 38} = 28,30 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}$$

Задачи

1. Проверьте, выполняется ли правило Дюкло – Траубе для разбавленных растворов насыщенных органических кислот, поверхностное натяжение которых приводится в следующей таблице:

Поверхностно-активное вещество	Капроновая кислота $CH_3(CH_2)_4COOH$	Энантовая кислота $CH_3(CH_2)_5COOH$	Каприловая кислота $CH_3(CH_2)_6COOH$	Каприновая кислота $CH_3(CH_2)_8COOH$
Концентрация, моль/м ³	1	1	0,073	0,0087
Поверхностное натяжение раствора, мН/м ²	71,20 (20 °C)	67,00 (20 °C)	70,4 (25 °C)	70,5 (25 °C)

Поверхностное натяжение чистой воды (мН/м²): 72,75 при 20 °C и 71,96 при 25 °C.

2. Вычислите поверхностный избыток масляной кислоты на поверхности раздела водный раствор-воздух при 293 К и концентрации 0,104 кмоль/м³, используя следующие данные:

c , кмоль/м ³	0,00	0,021	0,05	0,104	0,216	0,489
$\sigma \cdot 10^3$, Н/м	74,01	69,51	64,3	59,85	51,09	44,00

3. При какой концентрации поверхностное натяжение раствора валериановой кислоты будет равно $52,1$ мДж/м², если при температуре 273 К коэффициенты уравнения Шишковского $A_\infty = 4 \cdot 10^{-6}$ моль/м², $K = 56,9$ дм³/моль? Поверхностное натяжение воды $\sigma_0 = 75,59$ мДж/м².

4*. Раствор пальмитиновой кислоты $C_{16}H_{22}O_2$ в бензоле содержит $4,24$ г/дм³ кислоты. После нанесения раствора на поверхность воды бензол испаряется, и пальмитиновая кислота образует мономолекулярную пленку. Какой объем раствора кислоты требуется, чтобы покрыть мономолекулярным слоем поверхность $S = 500$ см². Площадь молекулы пальмитиновой кислоты в монослое $S_{\text{мол}} = 21$ Å.

5. Определите поверхностный избыток при 10 °С для раствора пеларгоновой кислоты молярной концентрации $0,000316$ моль/дм³, если поверхностное натяжение раствора равно $57 \cdot 10^3$ Н/м, а поверхностное натяжение воды при этой температуре равно $74,22 \cdot 10^{-3}$ Н/м.

6. Поверхностное натяжение водного раствора изовалериановой кислоты молярной концентрации $0,0312$ моль/дм³ при 15 °С равно $57,5 \cdot 10^{-3}$ Н/м. Определите поверхностный избыток кислоты на поверхности раствора, если поверхностное натяжение воды равно $73,49 \cdot 10^{-3}$ Н/м.

7. Поверхностное натяжение водного раствора гидроксида натрия массовой долей 20% при 20 °С равно $85,8 \cdot 10^{-3}$ н/м. Определите поверхностный избыток на поверхности раствора и сделайте вывод о поверхностной активности гидроксида натрия. Поверхностное натяжение воды при 20 °С равно $72,75 \cdot 10^{-3}$ Н/м, а плотность раствора NaOH равна $1,219$ г/см³.

8. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации валериановой кислоты при 80 °С описывается уравнением:

$$\sigma = 62,6 \cdot 10^{-3} - 17,7 \cdot 10^{-3} \ln(1 + 19,72C).$$

Определите поверхностный избыток валериановой кислоты на границе с воздухом из раствора, концентрация которого равна $0,05$ кмоль/м³.

9. Вычислите поверхностный избыток масляной кислоты при 273 К из водного раствора при концентрации $0,1$ кмоль/м³ на границе с воздухом, если зависимость поверхностного натяжения и концентрации описывается уравнением:

$$\sigma = 75,62 \cdot 10^{-3} - 16,7 \cdot 10^{-3} \ln(1 + 21,5C).$$

В каких пределах должна находиться адсорбция капроновой кислоты $C_5H_{11}COOH$ при тех же условиях, если выполняется правило Дюкло – Траубе?

10. Определите численное значение (кмоль/м²) и знак поверхностного избытка при 15 С для водного раствора, содержащего 29 г/л ацетона, если поверхностное натяжение раствора $54,9 \cdot 10^{-3}$ Н/м, а воды при данной температуре $73,49 \cdot 10^{-3}$ Н/м.

11. Поверхностное натяжение водного раствора серной кислоты с массовой долей 20% при 18 °С равно $75,2 \cdot 10^{-3}$ Н/м. Определите поверхностный избыток на поверхности раствора. Поверхностное натяжение воды при 18 °С равно $73,05 \cdot 10^{-3}$ н/м, а плотность раствора серной кислоты равна $1,143$ г/см³.

12. Поверхностное натяжение водного раствора с концентрацией пентанола 0,03 моль/дм³ равно $55,3 \cdot 10^{-3}$ Н/м при 298 К. Оцените величину поверхностного избытка из раствора с концентрацией бутанола 0,015 моль/дм³ при 298 К.

13. Поверхностное натяжение водного раствора, содержащего поверхностно-активное вещество (ПАВ) в концентрации 0,056 моль/дм³ при 293 К равно $4,33 \cdot 10^{-2}$ Н/м. Вычислите величину поверхностного избытка ПАВ из раствора с концентрацией 0,028 моль/дм³ при 293 К.

14. Определите поверхностный избыток (моль/м²) при 15°C для водного раствора ацетона, содержащего 29 г/дм³ ацетона, если поверхностное натяжение раствора $59,4 \cdot 10^{-3}$ Н/м, поверхностное натяжение воды — $73,49 \cdot 10^{-3}$.

Раздел 2. Синтез ПАВ.

1. Вопросы для обсуждения.

1. Синтез АПАВ. Соли высших жирных кислот.
2. Синтез АПАВ. Соли сульфоэфиров первичных и вторичных спиртов.
3. Синтез АПАВ. Алкиларилсульфонаты. Алкилсульфонаты.
4. Синтез АПАВ. Азотсодержащие анионные ПАВ.
5. Синтез неионогенных ПАВ. Оксиэтилированные спирты. Оксиэтилированные алкилфенолы
6. Синтез НПАВ. Алкиламины.
7. Синтез катионных поверхностно-активных веществ.
8. Синтез анионных поверхностно-активных веществ. Анионно ориентированные амфолитные ПАВ. Алкиламинокарбоновые кислоты. Приведите примеры.

2. Лабораторная работа № 2 «Изучение образования комплексных соединений между неионогенными поверхностно-активными веществами (НПАВ) с роданидом кобальта-аммония».

Принцип метода. Определение основано на образовании соединения, окрашенного в голубой цвет, при взаимодействии НПАВ с роданидом кобальта-аммония. Нижний предел обнаружения — 1 мг/дм³, измеряемые концентрации — от 1,0 до 20 мг/дм³. Определению мешают все анионактивные ПАВ.

Аппаратура и реактивы. Фотоэлектроколориметр любой системы с поглощением света от 400 до 800 нм и кюветой с толщиной слоя 0,1–5 см. Посуда стеклянная мерная, ГОСТ 1770-20292-74. Роданид аммония, х.ч. нитрат кобальта $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, ч.д.а. Роданид кобальта-аммония (помещают 15 г нитрата кобальта и 100 г роданида аммония в мерную колбу емкостью 500 см³, растворяют в дистиллированной воде, доводя объем раствора водой до метки).

Исходный стандартный водный раствор, содержащий 1 г/дм³ НПАВ.

Рабочий стандартный раствор готовят разбавлением исходного стандартного раствора дистиллированной водой.

Выполнение работы

Градуировочный график. Для приготовления шкалы стандартов в 9 пробирок емкостью 10 см³ вносят 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 10,0 см³ стандартного раствора НПАВ. Объем доводят до 10 см³ водой, к растворам прибавляют по 2 см³ раствора роданида кобальта-аммония, встряхивают 1 мин и через 5 мин измеряют оптические плотности. Измеряют оптические плотности растворов ($A_1, A_2 \dots A_9$). Для обработки результатов необходимо повторить работу.

Обработка результатов

Градуировочный график для определения ПАВ – зависимость в координатах «оптическая плотность растворов – концентрации ПАВ» приведен на рис. 3.




Рис. 3. Градуировочный график

Отчет по работе

Тема 4. Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ

1. Вопросы для обсуждения.

1. Дайте определение понятию ионный ассоциат. Приведите примеры.
2. Какие ионные ассоциаты способны образовывать анионные ПАВ? Приведите примеры.
3. Какие ионные ассоциаты способны образовывать катионные ПАВ? Приведите примеры.
4. Назовите современные методы определения синтетических ПАВ (СПАВ) в объектах окружающей среды.
5. Расскажите об определении катионных ПАВ в виде ионных ассоциатов с анионными красителями экстракционно-фотометрическим методом.
6. Расскажите об определении НПАВ в виде их соединений с роданидом кобальта.
7. Расскажите об определении АПАВ в виде их ионных ассоциатов с катионными красителями.
8. Описать физико-химические методы определения ПАВ в различных объектах.
9. Сорбционное концентрирование как подготовительный этап аналитического определения ПАВ.

2. Лабораторная работа № 3 «Изучение образования комплексных соединений между анионными поверхностно-активными веществами (АПАВ) с метиленовым синим».

Принцип метода. Определение основано на образовании ионного ассоциата, при взаимодействии АПАВ с метиленовым синим (или кристаллическим фиолетовым).

Аппаратура и реактивы. Фотоэлектроколориметр любой системы с поглощением света от 400 до 800 нм и кюветой с толщиной слоя 0,1–5 см. Посуда стеклянная мерная, ГОСТ 1770-20292-74. Раствор метиленового синего, ч.д.а. с концентрацией 0,03 %, очищенный хлороформом. Для очистки 10 см³ метиленового синего помещают в делительную воронку, приливают 5 см³ хлороформа, интенсивно встряхивают, после расслаивания жидкостей хлороформный слой отделяют, а водный слой используют для анализа. Фосфат калия однозамещенный, ч.д.а.; фосфатный буферный раствор, pH 10.

Растворяют 4,083 г фосфата калия в воде и доводят объем до 300 см³. Затем к раствору приливают 157,5 см³ 0,8%-ного раствора гидроксида натрия.

Исходный стандартный раствор (10 мг/см³) АПАВ.

Рабочий стандартный раствор, содержащий 1,0 мг/см³ АПАВ, готовят из исходного стандартного раствора разбавлением.

Выполнение работы

Градуировочный график. Для приготовления шкалы стандартов в 10 пробирок емкостью 10 см³ вносят 0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см³ рабочего стандартного раствора АПАВ. Объем доводят до 10 см³ водой, добавляют 2 см³ фосфатного буферного раствора с pH 10 и перемешивают. Далее прибавляют 1 см³ раствора метиленового синего, перемешивают 1 мин и через 5 мин измеряют оптические плотности растворов (A₁, A₂ ... A₁₀). Для обработки результатов следует повторить работу.

Обработка результатов

Градуировочный график для определения ПАВ – зависимость в координатах «оптическая плотность растворов – концентрации ПАВ» приведен на рис. 3.

Отчет по работе

3. Комплект тестовых заданий для промежуточного контроля знаний по дисциплине «Поверхностно-активные вещества»

1. Поверхностно-активные вещества – это:

- а) вещества способные увеличивать поверхностное натяжение на границе раздела фаз;
- б) вещества, адсорбирующиеся положительно и вызывающие снижение поверхностного натяжения растворителя;
- в) вещества, не изменяющие концентрацию раствора.

2. Для каких классов органических соединений характерно снижать поверхностное натяжение воды?

- а) спирты;
- б) альдегиды;
- в) кетоны;
- г) углеводороды и различные их производные;
- д) белки;
- е) соли щелочных металлов и аммония высших жирных кислот.

3. Мерой способности снижать поверхностное натяжение воды является:

- а) поверхностное натяжение;
- б) поверхностная активность;
- в) граница раздела фаз.

4. Молекулы ПАВ имеют строение:

- а) монофильное;
- б) гетерофильное;
- в) дифильное.

5. К природным ПАВ относятся:

- а) желчные кислоты;
- б) низкомолекулярные полисахариды;
- в) белки;
- г) полипептиды;

д) полиэтиленгликоли.

6. В зависимости от состояния ПАВ в растворе условно различают:

- а) истинно растворимые (молекулярно-диспергированные);
- б) катионные;
- в) анионные;
- г) неионные;
- д) коллоидные;
- е) амфолитные.

7. Какие вещества можно отнести к анионным ПАВ?

- а) $\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_n\text{COOM}$;
- б) $\text{RC}_6\text{H}_4(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{SO}_3\text{M}$;
- в) $[\text{RR}'_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{NR}'_2\text{R}]^{2+}2\text{X}^-$;
- г) $\text{RO}(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{H}$;
- д) $\text{RNH}(\text{CH}_2)_n\text{COOH}$.

8. Какие вещества можно отнести к катионным ПАВ?

- а) $\text{RNHC}_6\text{H}_4\text{COOH}$;
- б) $(\text{CH}_3)_3\text{Si}[\text{OSi}(\text{CH}_3)_2]_n-(\text{CH}_2)_3\text{O}(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_m\text{H}$;
- в) $\text{RR}'\text{R}''\text{N}^+\text{O}^-$;
- г) $[\text{R}_3\text{PR}']^+\text{X}^-$;
- д) $\text{SOOCCH}_2\text{SO}_3\text{M}$.

9. Чем обусловлено применение ПАВ?

- а) поверхностью активностью;
- б) структурой адсорбционных слоев;
- в) способом производства;
- г) объемными свойствами растворов.

10. Какие вещества можно отнести к неионным ПАВ?

- А) соли высших жирных кислот;
- б) оксиэтилированные алкилфенолы;
- в) соли сульфоэфиров первичных спиртов;
- г) оксиэтилированные спирты;
- д) алкиламинокарбоновые кислоты;
- е) алкиламины.

11. К анионно-ориентированным амфолитным ПАВ относятся:

- а) соединения с аминной группой и остатком минеральной кислоты;
- б) третичные амины;
- в) оксиэтилированные изооктилфенолы.

12. Количественной мерой избытка энергии, отнесенной к единице площади поверхности, является:

- а) площадь, занимаемая одной молекулой S^0 ;
- б) поверхностное натяжение σ ;
- в) адсорбция Γ_∞ .

13. Какое минимальное количество атомов углерода должен содержать углеродный скелет, чтобы вещество проявляло поверхностную активность?

- а) 3;

- б) 5;
- в) 7;
- г) 8.

14. Заряд поверхности твердых тел зависит от:

- а) фонового электролита;
- б) температуры;
- в) давления;
- г) количество поверхностных гидроксильных групп.

15. Поверхностно-активные вещества способны образовывать ассоциаты коллоидных растворов?

- а) нет;
- б) да;
- в) в редких случаях.

16. Для каких ПАВ характерно образование мицеллярных систем?

- а) неионогенных;
- б) амфолитных;
- в) ионогенных.

17. Мицеллы формируются:

- а) на границе раздела фаз;
- б) на дне сосуда;
- в) в объемной фазе дисперсионной среды.

18. Какие типы мицелл существуют?

- а) амфолитный;
- б) обычный;
- в) обращенный;
- г) необычный.

19. Склонность ПАВ к формированию мицелл зависит от:

- а) их строения;
- б) от соотношения размеров полярной и неполярной частей молекулы;
- в) внешнего давления;
- г) наличия небольшой углеводородной цепи.

20. Какие формы могут иметь мицеллы?

- а) цилиндрическую;
- б) плоского прямоугольника;
- в) дискообразную;
- г) сферическую,
- д) эллипсоидную.

21. Важнейшим свойством липидных мицелл является их способность:

- а) адсорбироваться;
- б) растворяться;
- в) солюблизировать.

22. Характеристикой коллоидных поверхностно-активных веществ является:

- а) температура;

- б) концентрация ПАВ;
- в) критическая концентрация мицеллообразования.

23. Свойства растворов ПАВ для достаточно высоких и низких концентраций:

- а) не отличаются;
- б) иногда отличаются;
- в) отличаются.

24. Изменение каких характеристик растворов позволяют определить ККМ?

- а) мутность;
- б) светопоглощение;
- в) электропроводность;
- г) показатель преломления;
- д) поверхностное натяжение.

25. В водных растворах ПАВ при очень низких концентрациях, соответствующих ККМ, какой формы образуются мицеллы?

- а) сферические;
- б) цилиндрические;
- в) дискообразные;

26. Свойства растворов ПАВ зависят от:

- а) адсорбционной способности;
- б) мицеллобразования;
- в) числа метиленовых групп в углеводородной цепи.

27. Во сколько раз увеличивается поверхностная активность ПАВ с увеличением длины углеводородной цепи на одну метиленовую группу?

- а) в 1,5;
- б) в 2;
- в) в 3,2.

28. При концентрации ПАВ ниже ККМ энергия Гиббса:

- а) не изменяется;
- б) уменьшается;
- в) увеличивается.

29. Фотометрическое определение АПАВ основано на:

- а) экстракции хлороформом;
- б) осаждении ионного ассоциата;
- в) адсорбции;
- г) проточно-инжекционный метод анализа с флуориметрией.

30. Детергенты не должны:

- а) быть определяемыми;
- б) оказывать токсическое воздействие;
- в) обладать способностью накапливаться в организме.

31. Расположите ПАВ в порядке уменьшения их раздражающей способности:

- а) анионные;
- б) катионные;
- в) неионные;

- г) амфолитные.
- а) к статическим методам измерения поверхностного натяжения относят;
- б) к полустатическим методам измерения поверхностного натяжения относят;

32. Поверхностные явления наблюдаются:

- а) в объеме фаз;
- б) в газовой фазе;
- в) на поверхности раздела фаз.

33. Состав поверхностного слоя:

- а) совпадает с составом объемной фазы;
- б) не совпадает с составом объемной фазы;
- в) это понятие не относится к поверхностному слою.

34. Межфазные поверхности могут существовать при наличии:

- а) жидкой и газообразной фазы;
- б) двух газообразных фаз;
- в) двух твердых фаз.

35. Поверхностный слой жидкости обновляется за счет процессов:

- а) замерзания;
- б) испарения;
- в) конденсации.

36. Поверхность жидкости:

- а) экспоненциальная;
- б) эквипотенциальная;
- в) эквимолярная.

37. Поверхностный слой обладает:

- а) внутренней границей;
- б) избытком энергии Гиббса;
- в) постоянной толщиной.

38. Поверхностная энергия Гиббса обусловлена:

- а) компенсированностью межмолекулярных сил притяжения поверхностного слоя;
- б) возникновением внутреннего давления жидкости;
- в) не компенсированностью межмолекулярных сил притяжения поверхностного слоя.

39. Шарообразная форма мелких капель жидкости объясняется:

- а) втягиванием молекул жидкости с поверхности в глубь фазы;
- б) равновесным состоянием молекул жидкости и поверхностного слоя;
- в) выталкиванием молекул жидкости из глубины фазы на поверхность.

40. Фактором интенсивности поверхностной энергии является:

- а) форма поверхности;
- б) поверхностная активность;
- в) поверхностное натяжение.

41. Поверхностное натяжение это частная производная от.....по изменению площади поверхности:

- а) энергии Гиббса;

- б) энергии Гельмгольца;
- в) затраченной работы;
- г) любого термодинамического потенциала.

42. Погрешность между энергией Гиббса и Гельмгольца при определении поверхностного натяжения можно пренебречь, если:

- а) фазы гомогенные;
- б) фазы газообразные;
- в) фазы конденсированные.

43. Поверхностное натяжение имеет:

- а) исторический смысл;
- б) физическое выражение;
- в) силовое определение.

44. Для твердых тел применимо понятие:

- а) поверхностное натяжение;
- б) удельная поверхностная энергия;
- в) поверхностное напряжение.

45. Для описания термодинамики поверхностных явлений применяют методы:

- а) градуировочного графика;
- б) «слоя конечной толщины»;
- в) наименьших квадратов;
- г) избыточных величин Гиббса.

46. Полной поверхностной энергией называют:

- а) энергию Гиббса;
- б) энергию Гельмгольца;
- в) затраченную работу;
- г) внутреннюю энергию.

47. Большой вклад в полную поверхностную энергию вносит:

- а) поверхностное натяжение;
- б) энтропийный фактор;
- в) теплота образования единицы поверхности.

48. Полная поверхностная энергия:

- а) зависит от температуры;
- б) не зависит от температуры;
- в) не зависит от температуры для неполярных жидкостей.

49. Теплота образования единицы поверхности зависит от температуры:

- а) прямо пропорционально;
- б) обратно пропорционально;
- в) экспоненциально.

50. Поверхностное натяжение зависит от температуры:

- а) прямо пропорционально;
- б) обратно пропорционально;
- в) экспоненциально.

51. Поверхностное натяжение зависит от разности полярности граничащих фаз:

- а) прямо пропорционально;
- б) обратно пропорционально;
- в) экспоненциально.

52. К ПИВ относят:

- а) растворы полярных органических жидкостей;
- б) растворы сильных неорганических электролитов;
- в) мицеллярные растворы.

53. Найдите соответствие:

- а) к статическим методам измерения поверхности натяжения относят;
- б) к полустатическим методам измерения поверхности натяжения относят;
- в) к динамическим методам измерения поверхности натяжения относят;
- г) метод отрыва кольца;
- д) метод капиллярных волн;
- е) метод Вильгельми;
- ж) метод взвешивания или счета капель;
- з) метод колеблющихся струй;
- и) метод максимального давления пузырька;
- к) метод лежащей капли;
- л) метод отрыва пластиинки;
- м) **метод капиллярного поднятия.**

Раздел 4. Гигиенические характеристики поверхностно-активных веществ

1. Вопросы для обсуждения.

1. Гигиенические характеристики поверхностно-активных веществ. Обсуждается проблема, связанная с тем, что необходима адекватная оценка пользы и вреда наносимого СПАВ. Рассматриваются химическая активность различных групп ПАВ, условия их синтеза, взаимодействие с организмами и экосистемами. В результате анализа физико-химических свойств СПАВ, условий их получения и токсикологического действия, формулируется токсикологическая шкала СПАВ. Какие вещества относят к детергентам? Чем обусловлена их токсичность?
2. Какие существуют нормы и дозы при различном поступлении в организм катионных, анионных, неионогенных поверхностно-активных веществ?
3. В чем заключается биологическое действие ПАВ при длительном поступлении в организм животных? Приведите примеры.
4. Имеется ли зависимость кожно-раздражающего и аллергического действия детергентов от химического строения и технологии их производства? В чем она проявляется?
5. В чем проявляется гигиеническое значение поверхностно-активных веществ в условиях зарязнения объектов окружающей среды?

2. Лабораторная работа № 4 «Изучение поверхностного натяжения растворов методом отрыва кольца».

Принцип метода. Метод отрыва кольца при изучении поверхностного натяжения растворов является одним из наиболее распространенных полустатических методов, основанных на достижении системой неустойчивого равновесного состояния. Определение основано на изучении условий, при которых нарушается состояние равновесия системы.

Аппаратура и реактивы. Растворы этилового, пропилового, изопропилового, бутилового и др. спиртов. Дистиллированная вода. Градуированные конические пробирки, пипетки, мерные колбы и химические стаканы ёмкостью 50 см³, чашки Петри, проволока толщиной 0,2-0,5мм, ножницы. Схема установки для изучения поверхностного натяжения жидкости (рис.14). Собираем установку для изучения поверхностного натяжения. Прибор состоит из стандартных торсионных весов, столика, с регулированной высотой подъёма, чашки Петри и опускаемого в раствор проволочного колечка.

Выполнение работы

Собирать установку для изучения поверхностного натяжения. Прибор состоит из стандартных торсионных весов, столика с регулируемой высотой подъема, чашки Петри и опускаемого в раствор проволочного колечка (рис. 4).




Рис. 4 . Схема установки для изучения поверхностного натяжения жидкости:

- 1 - столик с регулируемой высотой;
- 2 - торсионные весы;
- 3 - чашка Петри;
- 4 - подвеска с металлическим колечком (диаметр кольца около 15 мм, толщина проволочки 0,2-0,5 мм)

Вариант №1: для наблюдения изменения поверхностного натяжения при изменении концентрации растворов необходимо приготовить растворы, какого-то одного спирта (спирт выбрать по заданию преподавателя) последовательным разбавлением дистиллированной водой исходного раствора в два раза: например, 0, 0,2, 0,4, 0,8, 1,5, 3 моль/дм³.

Вариант №2: для наблюдения изменения поверхностного натяжения в гомологическом ряду веществ с удлинением углеродной цепи определяют поверхностное натяжение растворов разных спиртов с одинаковой концентрацией.

В чашку Петри налить вначале воду, опустить на её поверхность колечко и медленно, с помощью микрометрического винта опустить столик таким образом, чтобы можно было бы показания торсионных весов установить на ноль. Медленно приподнимая рычаг весов вверх оторвать колечко от воды и зафиксировать усилие отрыва кольца (P , мг). Эту операцию и для растворителя (дист. вода) и для растворов в каждом случае проделать не менее 6 раз, после чего данные внести в таблицу 1 и рассчитать среднюю величину усилия P отрыва кольца, провести статистическую обработку данных.

Таблица 1

Величины усилия отрыва кольца от растворов ($n = 6$)

Вариант №1:

C (спирта), моль/дм ³	0					

P_1 , мГ						
P_2 , мГ						
P_3 , мГ						
P_4 , мГ						
P_5 , мГ						
P_6 , мГ						
$P = P_{\text{срэд}} \pm \frac{t_p \cdot s}{\sqrt{n}}$, мГ						

Вариант №2

Наименование спирта	C (спиртов), моль/дм ³					
	P_1 , мГ	P_2 , мГ	P_3 , мГ	P_4 , мГ	P_5 , мГ	P_6 , мГ
этиловый						
пропиловый						
изопропиловый						
бутиловый						
изобутиловый						
амиловый						

Обработка результатов

Величина поверхностного натяжения σ_x рассчитывается по формуле: $\sigma_x = \sigma_0 \frac{P_x}{P_0}$,

где σ_0 - поверхностное натяжение растворителя (табл.2), P_x – средняя величина усилия отрыва кольца от раствора, P_0 – средняя величина усилия отрыва кольца от растворителя.

Таблица 2

Поверхностное натяжение воды

Температура, °C	Поверхностное натяжение, Н/м	Температура, °C	Поверхностное натяжение, Н/м
0	0,07549	35	0,07029
5	0,07475	40	0,06954
10	0,07401	45	0,0686
15	0,04326	50	0,0678
20	0,07253	60	0,0660
25	0,07178	70	0,0642
30	0,07103	80	0,0623

Сделать расчеты по приведённой выше формуле для значений поверхностного натяжения исследованных растворов; данные внести в таблицу 3 (вариант №1) или таблицу 4 (вариант №2).

Таблица 3

Изменение поверхностного натяжения раствора с разной концентрацией

Спирт	Концентрация раствора, моль/дм ³	Поверхностное натяжение, 10^{-3} Дж/м ²
	0	

Таблица 4

Изменения поверхностного натяжения в гомологическом ряду веществ

Спирт	Концентрация раствора, моль/дм ³	Поверхностное натяжение, 10 ⁻³ Дж/м ²
этиловый		
пропиловый		
изопропиловый		
бутиловый		
амиловый		

Отчет по работе

По данным таблиц 3 или 4 построить графические зависимости. Работа считается выполненной, если приведены все необходимые расчеты, построены изучаемые зависимости, приведены все структурные формулы изучаемых веществ, сделаны выводы соответствующие поставленной цели

Сравните результаты, полученные методом отрыва кольца и методом счета капель. Объясните наблюдаемые зависимости.

3. Комплект задач (заданий) для практических занятий по дисциплине «Поверхностно-активные вещества»

Методические рекомендации к решению усложненных задач

Примеры решения типовых задач

1. Сравните поверхностную активность пропионовой и масляной кислот в водных растворах в данном интервале концентраций, если известно:

Кислота	C, моль/дм ³	σ, мН/м
пропионовая	0,0312	69,5
	0,0625	67,7
масляная	0,0312	65,8
	0,0625	60,4

Выполняется ли правило Траубе—Дюкло?

Решение. Мерой поверхностной активности является $g = -\frac{d\sigma}{dc}$, или в узких

интервалах, приблизительно: $g = g = -\frac{\Delta\sigma}{\Delta c} = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{c_2 - c_1}$.

$$g(C_2H_5COOH) = -\frac{\Delta\sigma}{\Delta c} = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{c_2 - c_1} = \frac{(67,7 - 69,5) \cdot 10^{-3}}{(0,0625 - 0,0312) \cdot 10^3} = 57,5 \cdot 10^{-6} \text{ Н}\cdot\text{м}^2/\text{моль}.$$

$$g(C_3H_7COOH) = -\frac{\Delta\sigma}{\Delta c} = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{c_2 - c_1} = \frac{(60,4 - 65,8) \cdot 10^{-3}}{(0,0625 - 0,0312) \cdot 10^3} = 172,5 \cdot 10^{-6} \text{ Н}\cdot\text{м}^2/\text{моль}.$$

По правилу Траубе — Дюкло поверхностная активность веществ одного и того же гомологического ряда возрастает приблизительно в 3 раза при увеличении углеводородной цепи на группу $-CH_2-$:

$$\frac{g(C_3H_7COOH)}{g(C_2H_5COOH)} = \frac{172,5 \cdot 10^{-6}}{57,5 \cdot 10^{-6}} \approx 3$$

Правило Траубе—Дюкло выполняется в заданном интервале концентраций.

6. По данным кондуктометрического метода графически определите критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ) водного раствора лаурата натрия:

Концентрация мыла C, кг/м³

2 3 5 10 20 30

Удельная электропроводность, $\kappa \cdot 10^5$,
 $\text{Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$

0,5 0,77 1,27 1,67 2,43 3,2

Решение. По табличным данным строим график в координатах $\kappa = f(C)$ и находим точку излома, соответствующую ККМ.




Рис. 9. Графическое определение ККМ раствора лаурата натрия

Как следует из рисунка, ККМ равна 5 кг/м³.

7*. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) додецилсульфата натрия при 20, 40 и 60°C составляет соответственно $1,51 \cdot 10^{-3}$; $1,62 \cdot 10^{-3}$ и $1,87 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³. Рассчитайте стандартную теплоту, энергию Гиббса и энтропию мицеллообразования при 20 °C.

Решение. Теплоту мицеллообразования q определяем по температурной зависимости ККМ:

$$\ln KKM = \frac{\Delta H_m^0}{RT} + const = -\frac{q}{RT} + const$$

Рассчитываем значения $\ln KKM$ и $1/T$:

$\ln KKM$	-6,50	-6,42	-6,28
$1/T \cdot 10^3, \text{K}^{-1}$	3,41	3,19	3,00

Строим график зависимости $\ln KKM$ от $1/T$.




Рис.10. Графическое определение теплоты мицеллообразования додецилсульфата натрия

Теплоту мицеллообразования определяем по тангенсу угла наклона прямой ($\operatorname{tg}\alpha$):

$$\operatorname{tg}\alpha = -\frac{q}{R} = -537, \text{ отсюда: } q = 8,31 \cdot 537 = 4,46 \text{ кДж/моль.}$$

Энергию Гиббса рассчитываем по уравнению:

$$\Delta G_m^0 = RT \ln KKM = 8,31 \cdot 293 \cdot \ln 1,51 \cdot 10^{-3} = -15,83 \text{ кДж/моль.}$$

Энтропию мицеллообразования находим, пользуясь термодинамическим уравнением: $\Delta S_m^0 = \Delta H_m^0 - T\Delta G_m^0$

$$\Delta S_i^0 = \frac{\Delta H_i^0 - \Delta G_i^0}{T} = \frac{-4,46 - (-15,83)}{293} = 0,039 \text{ кДж/моль}\cdot\text{К}$$

Задачи

1. Для водного раствора пропилового спирта при 295 К найдены следующие значения констант уравнения Шишковского: $b = 0,189$, $a = 0,151$. Вычислите поверхностное натяжение раствора при концентрации спирта, равной $0,5 \text{ кмоль}/\text{м}^3$.

2. Через сталагмометр при 24°C пропустили сначала волу, затем этанол. При этом число капель составило 29 и 76 соответственно. Уменьшится или увеличится поверхностное натяжение этанола и во сколько раз, если температуру повысить до 60°C ($\sigma^{60} (C_2H_5OH) = 18,43 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}; \rho = 0,79 \text{ г}/\text{см}^3$)?

3. Вычислите поверхностное натяжение воды при 20°C по следующим данным сталагмометрического исследования: число капель воды — 31, число капель ацетона — 95. Поверхностное натяжение ацетона при 20°C равно $23,70 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}$.

4. Вычислите по данным сталагмометрического исследования поверхностное натяжение этилового спирта при 25°C , если число капель воды — 32, а спирта — 64. Массы капель спирта и воды равны 4,713 и 4,724 г соответственно. Поверхностное натяжение воды при 25°C равно $71,97 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}$.

5. Сравните поверхностную активность метилпропанола и метилбутанола в водных растворах в данном интервале концентраций:

Спирт	$C, \text{ моль}/\text{дм}^3$	$\sigma, \text{ мН}/\text{м}$
Метилпропанол	0,125	52,8
	0,250	44,1
Метилбутанол	0,125	47,6
	0,250	23,7

Выполняется ли правило Траубе—Дюкло?

6. Поверхностное натяжение водного раствора, содержащего поверхностно-активное вещество (ПАВ) в концентрации $0,056 \text{ моль}/\text{дм}^3$ при 293 К равно $4,33 \cdot 10^{-2} \text{ Н/м}$. Вычислите величину поверхностного избытка ПАВ из раствора с концентрацией $0,028 \text{ моль}/\text{дм}^3$ при 293 К .

7. Определите величину поверхностной активности лаурата натрия, если логарифм ККМ его водного раствора составляет 168 (концентрация в $\text{моль}/\text{дм}^3$); $\sigma_{\text{KKM}} = 40 \text{ эрг}/\text{см}^{-2}$; $\sigma_0 = 71,18 \text{ эрг}/\text{см}^{-2}$.

8. Для водных растворов додецилсульфата натрия определены логарифмы ККМ при двух значениях температуры. Определите, как влияет повышение температуры на поверхностную активность додецилсульфата натрия. $\lg_{\text{KKM}} = -2,04$ (при 20°C) и $\lg_{\text{KKM}} = -2,01$ (при 60°C); $\sigma_{\text{KKM}} = 44 \text{ эрг}/\text{см}^2$ (при 20°C), $\sigma_{\text{KKM}} = 41 \text{ эрг}/\text{см}^2$ (при 60°C); $\sigma_0 = 72,75 \text{ эрг}/\text{см}^2$ (при 20°C); $\sigma_0 = 66,18 \text{ эрг}/\text{см}^2$ (при 60°C); концентрация в моль/дм³.

9. Логарифм ККМ водного раствора олеата натрия при 7°C составляет -30 при выражении концентрации в моль/дм³, $\sigma_{\text{KKM}} = 26 \text{ эрг}/\text{см}^2$, $\sigma_0 = 74,64 \text{ эрг}/\text{см}^2$. Определите величину поверхностной активности олеата натрия.

10. Для водных растворов лаурата натрия определены логарифмы ККМ при нескольких значениях температуры (концентрация в моль/дм³). Постройте температурную зависимость поверхностной активности:

$T, ^{\circ}\text{C}$	\lg_{KKM}	$\sigma_{\text{KKM}}, \text{эрг}/\text{см}^2$	$\sigma_0, \text{эрг}/\text{см}^2$
30	-1,68	40	71,18
50	-1,68	38	67,91
90	-1,68	31	60,75

11. Определите ККМ додецилсульфата натрия по следующим данным:
 $\lg C \quad -2,4 \quad -2,18 \quad -2,08 \quad -2,03 \quad -2,01 \quad -1,99 \quad -1,95 \quad -1,82$
 $\sigma, \text{дин}/\text{см} \quad 54 \quad 47 \quad 43 \quad 42 \quad 41 \quad 41 \quad 41 \quad 41$
 Концентрация выражена в моль/дм³.

12. При измерении разности показателей преломления водных растворов додецилсульфата натрия и воды получены следующие данные:
 $C \cdot 10^3, \text{моль}/\text{дм}^3 \quad 9,1 \quad 9,38 \quad 9,54 \quad 9,78 \quad 10,02 \quad 10,26 \quad 10,50$
 $\Delta n \quad - \quad - \quad 16,6 \quad 17,1 \quad 17,7 \quad 18,0 \quad 18,3$
 Определите ККМ.

13. Определите величину поверхностной активности миристата натрия зная, что логарифм ККМ его водного раствора равен $-2,3$ при выражении концентрации в моль/дм³ ($\sigma_{\text{KKM}} = 27 \text{ дин}/\text{см}$; $\sigma_0 = 69,56 \text{ дин}/\text{см}$).

Раздел 5. Строение мицелл ПАВ.

1. Вопросы для обсуждения.

1. Какие ПАВ образуют мицеллярные системы? От чего это зависит? Приведите примеры.
2. Какие типы мицелл могут образовать ПАВ? Каково их строение и форма?
3. Чем обусловлены свойства мицелл? Как это применяют на практике? Приведите примеры.
4. Объясните понятие критической концентрации мицеллообразования (ККМ).
5. От каких факторов зависит достижение ККМ? Приведите зависимости и примеры.
6. Какими физико-химическими методами можно определять ККМ? Приведите зависимости и примеры.
7. Как влияет длина углеводородной цепи молекул ПАВ на термодинамические параметры адсорбции и мицеллообразования в водных растворах?

2. Лабораторная работа № 5 «Измерение поверхностного напряжения по методу отрывающейся капли»

Принцип метода. Падающая капля жидкости имеет форму, при которой ее поверхность бывает наименьшей (шар). На поверхности жидкости имеется что-то вроде пленки, которая стремится ее сжать. Появление такого слоя (пленки) на поверхности жидкости объясняется следующим образом. Пусть внутри жидкости содержится молекула А (рис. 5). Опишем вокруг нее сферу радиусом, равным расстоянию, на котором заметны силы взаимного притяжения этой молекулы с окружающими ее молекулами жидкости. Вследствие того, что эти равные силы действуют по всем направлениям симметрично, равнодействующая им сила равна нулю.




Рис. 5. Схема межмолекулярных притяжений

В другом положении находится молекула Б. Силы притяжения, действующие со стороны молекул жидкости, не уравновешиваются силами, действующими на частицу вне жидкости, в результате чего равнодействующая притяжения этой молекулы направлена в сторону жидкости, вниз, — молекула стремится втянуться внутрь жидкости. В таком положении находятся все молекулы, образующие поверхностный слой жидкости, вследствие чего возникает внутреннее давление в жидкости, направленное нормально к ее поверхностному слою.

Наличие на поверхности жидкости молекул, не уравновешенных межмолекулярными силами, создает в поверхностном слое свободную поверхностную энергию, стремящуюся уменьшиться. На поверхности жидкости образуется что-то похожее на пленку, обладающую поверхностным натяжением. Чтобы увеличить поверхность жидкости, т. е. чтобы преодолеть, ее поверхностное натяжение, необходимо затратить некоторое количество работы. Работа необходимая для увеличения поверхности жидкости на 1 см², служит мерой поверхностной энергии и называется коэффициентом поверхностного натяжения или просто поверхностным натяжением.

Можно рассматривать поверхностное натяжение не только как работу на единицу поверхности, но и как силу, которая действует на единицу длины (1 м) линии, ограничивающей поверхность, и стремится сократить последнюю. В зависимости от того или иного определения поверхностное натяжение измеряется или в джоулях на 1 м², или в ньютонах на 1 м. Оба измерения численно совпадают. Вследствие наличия поверхностного натяжения жидкость, вытекающая из капиллярного отверстия, принимает форму капли.

Отрыв капли наступает тогда, когда ее масса преодолевает действие поверхностного натяжения. Поверхностным натяжением обусловливается также поднятие жидкости в капилляре, если она смачивает его стенки. Это поднятие объясняется тем, что жидкость, смачивая стенки (как бы растекаясь по ним), увеличивает поверхностное натяжение, которое стремится уменьшить поверхность. Уменьшение поверхности достигается тем, что жидкость поднимается в капилляре вслед за смачивающим слоем. Высота поднятия жидкости определяется массой столба жидкости, уравновешивающей поверхностное натяжение. По высоте, диаметру столба и плотности жидкости можно рассчитать величину поверхностного натяжения.

Растворенные вещества изменяют поверхностное натяжение жидкости. Одни из них значительно понижают поверхностное натяжение (они называются поверхностно-

активными или капиллярно-активными), другие (поверхностно-неактивные) несколько увеличивают поверхностное натяжение. Концентрация в поверхностном слое и внутри раствора поверхностно-активных и поверхностно-неактивных веществ различна. Концентрация первых веществ в поверхностном слое больше, чем внутри раствора, а вторых – наоборот. Это явление изменения концентрации вещества в поверхностном слое по сравнению с концентрацией его внутри раствора называется *адсорбцией*. В зависимости от того, уменьшается или увеличивается концентрация вещества в поверхностном слое раствора по сравнению с внутренними слоями, адсорбция называется положительной или отрицательной.

К поверхностно-активным веществам, значительно понижающим поверхностное натяжение воды, относятся многие органические соединения, например, спирты, альдегиды, кетоны, кислоты. В гомологическом ряду жирных кислот поверхностная активность быстро возрастает с удлинением углеродной цепи, а именно в среднем в 3,2 раза на каждую прибавляющуюся группу CH_2 . Следовательно, в таком же отношении с ростом поверхностной активности будет уменьшаться значение поверхностного натяжения раствора.

Приближенное измерение поверхностного натяжения жидкости может быть проведено при помощи прибора, называемого сталагмометром.

Принцип метода заключается в определении массы капли, вытекающей из капилляра, в момент ее отрыва. Отрыв капли наступает тогда, когда масса ее будет на ничтожно малую величину превышать силу поверхностного натяжения. Практически можно считать, что в момент отрыва капли масса ее уравновешивается поверхностным натяжением. Тогда задача опыта сводится к определению массы капли. Если объем вытекающей жидкости равен V , число капель жидкости в объеме V равно n , плотность жидкости d и ускорение силы тяжести g , то массу одной капли вычисляют по формуле:

$$\alpha = \frac{V \cdot d \cdot g}{n}. \quad (1)$$

Поверхностное натяжение равно $2\pi r\sigma$, где r – радиус капилляра, σ – поверхностное натяжение. Следовательно,

$$\frac{V \cdot d \cdot g}{n} = 2\pi r\sigma, \quad (2)$$

где $2\pi r\sigma$ для данного прибора – величина постоянная; обозначим ее через K , тогда

$$\frac{V \cdot d \cdot g}{n} = K \cdot \sigma, \quad (3)$$

откуда

$$\sigma = \frac{V \cdot d \cdot g}{n \cdot K}. \quad (4)$$

Для воды, вытекающей из этого же капилляра и в таком же объеме,

$$\sigma_0 = \frac{V \cdot d_0 \cdot g}{n_0 \cdot K}, \quad (5)$$

где d_0 – плотность воды; n_0 – число капель.

Разделив уравнение 4 на уравнение 5, получим:

$$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \frac{d \cdot n_0}{d_0 \cdot n}, \quad (6)$$

откуда поверхностное натяжение исследуемой жидкости равно

$$\sigma = \sigma_0 \cdot \frac{d \cdot n_0}{d_0 \cdot n} \quad (7)$$

Цель работы: Ознакомление с измерением поверхностного натяжения методом взвешивания отрывающейся капли. Наблюдение влияния температуры на изменение поверхностного натяжения.

Аппаратура и реактивы. Стала́гмометр; штатив с лапкой; четыре стакана на 100 мл; 1,0 М растворы метилового (CH_3OH), этилового ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) и амилового ($\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$) спиртов.

Описание прибора. Стала́гмометр (рис. 6) состоит из трубки, имеющей расширение 1; выше и ниже него находятся начальная и конечная метки *А* и *Б*. Через капиллярное отверстие 2 в широкой горизонтальной отшлифованной поверхности жидкость вытекает из капель.




Рис. 6. Стала́гмометр:
1 – расширение; 2 – отверстие капилляра; *А*, *Б* – метки

Выполнение работы

Вариант №1: для наблюдения изменения поверхностного натяжения при изменении концентрации растворов необходимо приготовить растворы, какого-то одного спирта (спирт выбрать по заданию преподавателя) последовательным разбавлением дистиллированной водой исходного раствора в два раза: например, 0, 0,2, 0,4, 0,8, 1,5, 3 моль/дм³.

Вариант №2: для наблюдения изменения поверхностного натяжения в гомологическом ряду веществ с удлинением углеродной цепи определяют поверхностное натяжение растворов разных спиртов с одинаковой концентрацией.

Стала́гмометр (бюretку) укрепляют в штативе в вертикальном положении и заливают жидкость так, чтобы она стояла выше верхней метки (при этом в трубке не должно быть пузырьков воздуха), затем дают жидкости вытекать из капилляра. Когда уровень жидкости точно совпадает с верхней меткой, начинают счет капель; прекращают счет капель тогда, когда уровень жидкости дойдет до нижней метки (или когда в бюretке уровень жидкости уменьшится на 2 см³). Опыт повторяют несколько раз и берут среднюю величину из наблюдаемых отсчетов (расхождение между отдельными измерениями должно быть не более 1–2 капель). Результаты свети в таблицу 1.

Таблица 1

Число капель растворов в определённом объёме жидкости ($n = 6$)

Вариант №1:						
C (спирта), моль/дм ³	0					
n_1						
n_2						
n_3						
n_4						
n_5						
n_6						

$n = n_{\text{сред}} \pm \frac{t_p \cdot S}{\sqrt{n}}$						
Вариант №2						
Наименование спирта	C (спиртов), моль/дм ³					
	n_1	n_2	n_3 , МГ	n_4	n_5	n_6
этиловый						
пропиловый						
изопропиловый						
бутиловый						
изобутиловый						
амиловый						

Обработка результатов

Указанным методом определяют среднее число капель воды, образующихся при истечении из бюретки объема V , а затем число капель исследуемых растворов из этого же объема. Поверхностное натяжение вычисляют по выведенной выше формуле:

$$\sigma = \frac{\sigma_0 \cdot d \cdot n_0}{d_0 \cdot n},$$

где σ_0 - поверхностное натяжение растворителя (табл.2), d_0 – плотность воды; n_0 – число капель воды, n – число капель жидкости в объеме V , d – плотность жидкости.

Таблица 2

Поверхностное натяжение воды

Температура, °C	Поверхностное натяжение, Н/м	Температура, °C	Поверхностное натяжение, Н/м
0	0,07549	35	0,07029
5	0,07475	40	0,06954
10	0,07401	45	0,0686
15	0,04326	50	0,0678
20	0,07253	60	0,0660
25	0,07178	70	0,0642
30	0,07103	80	0,0623

Сделать расчеты по приведённой выше формуле для значений поверхностного натяжения исследованных растворов; данные внести в таблицу 3 (вариант №1) или таблицу 4 (вариант №2).

Таблица 3

Изменение поверхностного натяжения раствора с разной концентрацией

<i>Спирт</i>	Концентрация раствора, моль/дм ³	Поверхностное натяжение, 10^{-3} Дж/м ²
	0	

Таблица 4

Изменения поверхностного натяжения в гомологическом ряду веществ

<i>Спирт</i>	Концентрация раствора, моль/дм ³	Поверхностное натяжение, 10^{-3} Дж/м ²
этиловый		

пропиловый		
изопропиловый		
бутиловый		
амиловый		

Отчет по работе

По данным таблиц 3 или 4 построить графические зависимости. Работа считается выполненной, если приведены все необходимые расчеты, построены изучаемые зависимости, приведены все структурные формулы изучаемых веществ, сделаны выводы соответствующие поставленной цели.

Сравните результаты, полученные методом отрыва кольца и методом счета капель. Объясните наблюдаемые зависимости.

Раздел 6. Поверхностные явления. Причины возникновения. Термодинамика поверхностных явлений. Поверхностное натяжение. Изотермы. Методы определения.

1. Вопросы для обсуждения.

1. Какие явления относят к поверхностным?
 2. Каковы причины возникновения поверхностных явлений?
 3. Классификация поверхностных явлений через объединенное уравнение I и II начал термодинамики. Приращение поверхностной энергии в другие виды энергии.
 4. Геометрические параметры поверхности. Поверхностный слой жидкости и твердого тела.
 5. Поверхностная энергия Гиббса.
 6. Поверхностное натяжение. Термодинамическое определение. Физический смысл и силовое определение.
 7. Термодинамика поверхностных явлений. Методы описания термодинамики поверхностных явлений, их достоинства и недостатки.
 8. Полная удельная поверхностная энергия. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Температурный коэффициент поверхностного натяжения.
 9. Температурная зависимость поверхностного натяжения (σ).
 10. Зависимость энергетических параметров поверхности от полярности жидкостей. Правило П.А. Ребиндера для различных жидкостей.
 11. Влияние природы граничащих фаз на поверхностное натяжение. Правило Г.Н. Антонова.
 12. Зависимость поверхностного натяжения раствора от природы и концентрации растворенных веществ. Изотермы поверхностного натяжения (3 типа). Уравнение Б.А. Шишковского (ПАВ).
 13. Методы измерения поверхностного натяжения. Статические методы: метод Вильгельми, метод капилярного поднятия, метод лежачей капли.
 14. Полустатистические методы: метод отрыва пластиинки, метод отрыва кольца, метод взвешивания или счета капель.
 15. Динамические методы. Сравнения трех типов методов. Самопроизвольные процессы в поверхностном слое. Какие факторы определяют уменьшение поверхностной энергии (ΔG). В результате чего формируется структура поверхностного слоя?
- 2. Лабораторная работа № 6 «Изучение критической концентрации мицеллообразования анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) с катионными красителями»**

Принцип метода. АПАВ с катионными красителями образуют ионные пары (ионные ассоциаты), т.к. заряд красителя и АПАВ теряется, ионная пара электронейтральна, поэтому ионные пары в виде сконденсированных частиц выпадают в

осадок. Используя данные явления, можно изучить критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ).

Аппаратура и реактивы. Фотоэлектроколориметр любой системы с поглощением света от 400 до 800 нм и кюветой с толщиной слоя 0,1–5 см. Посуда стеклянная мерная, ГОСТ 1770-20292-74. Метиленовый фиолетовый, ч.д.а. раствор с концентрацией 10^{-3} моль/дм³. Аммонийный буферный раствор, pH 10.

Исходный стандартный раствор 10^{-2} моль/дм³ АПАВ.

Рабочий стандартный раствор, 10^{-3} моль/дм³ АПАВ, готовят из исходного стандартного раствора разбавлением.

Выполнение работы

Для приготовления шкалы стандартов в 10 пробирок емкостью 10 см³ вносят 0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см³ рабочего стандартного раствора АПАВ. Объем доводят до 10 см³ водой, добавляют 2 см³ буферного раствора с pH 10 и перемешивают. Далее прибавляют 1 см³ раствора метиленового фиолетового, перемешивают 1 мин и через 30 мин измеряют оптические плотности растворов ($A_1, A_2 \dots A_{10}$). Для обработки результатов повторить работу.

Обработка результатов

По результатам измерения оптических плотностей строят зависимость «оптическая плотность растворов – концентрация ПАВ» (рис. 15). В точке ККМ наблюдается излом прямой. Для нахождения ККМ к излуку прямой провести касательные, из точки пересечения касательных опустить перпендикуляр на ось абсцисс и определить точку критической концентрации мицеллообразования.




Рис. 19. Графический способ нахождения ККМ

Отчет по работе.

3. Комплект заданий для контрольной работы

Контрольная работа №1 по теме: «Физико-химические свойства поверхностно-активных веществ»

Вариант 1

1. Задание 1. По данным кондуктометрического метода графически определите ККМ водного раствора лаурата натрия.

Концентрация мыла	$C, \text{ кг}/\text{м}^3$	2	3	5	10	20	30
Удельная электропроводность, $\kappa \cdot 10^5, \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$	0,5	0,77	1,27	1,67	2,43	3,2	

2. Задание 2. Поверхностное натяжение на границе ртуть-воздух равно $72,75 \cdot 10^{-3}$ Дж/м². Чему равна избыточная поверхностная энергия капли ртути диаметром 1,2 мм.

3. Задание 3. Поверхностное натяжение на границе ртуть-воздух равно $72,75 \cdot 10^{-3}$ Дж/м². Чему равна избыточная поверхностная энергия капли ртути диаметром 1,2 мм.

Вариант 2

- Задание 1.** Вычислите по данным сталагмометрического исследования поверхностное натяжение этилового спирта при 25°C, если число капель воды — 32, а спирта — 64. Массы капель спирта и воды равны 4,713 и 4,724 г соответственно. Поверхностное натяжение воды при 25°C равно $71,97 \cdot 10^{-3}$ Н/м.
- Задание 2.** Для водных растворов лаурата натрия определены логарифмы ККМ при нескольких значениях температуры (концентрация в моль/дм³). Постройте температурную зависимость поверхностной активности:

T, °C	lg _{ККМ}	σ _{ККМ}	σ ₀
30	-1,68	40	71,18
50	-1,68	38	67,91
90	-1,68	31	60,75

- Задание 3.** Сравните поверхностную активность пропионовой и масляной кислот в водных растворах в данном интервале концентраций, если известно:

Кислота	C, моль/дм ³	σ, мН/м
пропионовая	0,0312	69,5
	0,0625	67,7
масляная	0,0312	65,8
	0,0625	60,4

Выполняется ли правило Траубе—Дюкло?

Перечень вопросов и заданий, выносимых зачёт

Таблица 9. Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
ПК-5. Способен проводить критический анализ полученных результатов и оценивать перспективы продолжения работ в выбранной области химии, химической технологии или смежных с химией наук				
1.	Задание закрытого типа	Поверхностные явления наблюдаются: а) в объеме фаз; б) в газовой фазе; в) на поверхности раздела фаз.	в	1
2.		Состав поверхностного слоя: а) совпадает с составом объемной фазы; б) не совпадает с составом объемной фазы; в) это понятие не относится к поверхностному слою.	б	1
3.		Межфазные поверхности могут существовать при	а	1

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
		наличии: <i>a) жидкой и газообразной фазы;</i> <i>б) двух газообразных фаз;</i> <i>в) двух твердых фаз.</i>		
4.		Поверхностный слой жидкости обновляется за счет процессов: <i>a) замерзания;</i> <i>б) испарения;</i> <i>в) конденсации.</i>	б, в	1
5.		Поверхность жидкости: <i>а) экспоненциальная;</i> <i>б) эквипотенциальная;</i> <i>в) эквимолярная.</i>	а	1
6.	Задание открытого типа	Ситуационная задача. Какие вещества называют поверхностью-активными веществами? Приведите примеры.	ПАВ объединяет их основное свойство – способность снижать поверхностное натяжение воды или водных растворов различных соединений. Способность снижать поверхностное натяжение воды характерно для многих классов органических соединений, например, для спиртов, альдегидов, кетонов, углеводородов и различных их производных. Мерой способности снижать поверхностное натяжение воды является поверхностная активность. Ею в огромной степени обладают соли щелочных металлов и аммония высших жирных кислот,	2

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
			различные полимеры на основе этиленгликоля (полиэтиленгликоли), азотсодержащие органические соединения, особенно те, в которых азот связан четырьмя ковалентными связями и несет положительный заряд.	
7.		Ситуационная задача. Чем обусловлены особые свойства ПАВ?	ПАВ обычно дифильны – они содержат в своей структуре полярную часть (гидрофильная часть) и неполярный участок, обычно углеводородную цепь (гидрофобная часть), и эти две части придают рассматриваемым веществам особые свойства. Это способность образовывать мицеллы-агрегаты различной конфигурации, которые могут увлекать из растворов органические и неорганические вещества или переводить труднорастворимые в воде вещества в коллоидно-диспергированное состояние.	2
8.		Ситуационная задача. В чем заключается условность в классификации ПАВ по состоянию?	В зависимости от состояния ПАВ в растворе условно различают истинно растворимые (молекулярно-	2

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
			<p>диспергированные) и коллоидные ПАВ. Условность такого разделения состоит в том, что одно и то же ПАВ может относиться к обеим группам в зависимости от условий и химической природы (полярности) растворителя. Обе группы ПАВ адсорбируются на фазовых границах, то есть проявляют в растворах поверхностную активность, в то время как объемные свойства, связанные с возникновением коллоидной (мицеллярной) фазы, проявляют лишь коллоидные ПАВ.</p>	
9.	<p>Ситуационная задача. Раскройте понятие гидрофильно-липофильного баланса. Как и для чего определяют ГЛБ?</p>		<p>Группы ПАВ отличаются значением безразмерной величины, которая называется <i>гидрофильно-липофильном балансом</i> (ГЛБ) и определяется отношением:</p> $\lambda = (b + \Psi_V) / a,$ <p>где $(b + \Psi_V)$ - средство (свободная энергия взаимодействия) неполярной части молекулы ПАВ к углеводородной жидкости (b - безразмерный параметр, зависящий от природы ПАВ, Ψ -</p>	3

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
			<p>свободная энергия взаимодействия в расчете на одну группу CH_2, v - число групп CH_2 в углеводородном радикале), a - сродство полярной группы к воде. Минимальное число углеродных атомов в радикале для разных видов коллоидных ПАВ лежит в пределах 8-12, то есть коллоидные ПАВ имеют достаточно большой углеводородный радикал. Вместе с тем коллоидные ПАВ должны обладать и истинной растворимостью в воде, то есть полярность гидрофильной группы также должна быть достаточно высокой. В начале 60-х гг. XX в. Д. Девидсон была разработана шкала ГЛБ со значениями от 0 до 40. ПАВ с лиофильными свойствами имеют низкие значения ГЛБ, с гидрофильными - высокие. Каждой группе атомов, входящей в молекулу ПАВ, приписывается групповое число. При сложении этих чисел получают ГЛБ по формуле:</p> $\text{ГЛБ} = \sum \text{гидрофильных групповых чисел} + \sum$	

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
			гидрофобных групповых чисел + 7.	
10.		Ситуационная задача. В чем заключается моющее действие ПАВ?	Моющее действие ПАВ заключается в удалении с очищаемой поверхности прилипших к ней мельчайших частиц грязи и тончайших масляных пленок. Согласно разработанной теории П.А. Ребиндера, моющее действие представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных процессов: смачивания, пептизации, эмульгирования и стабилизации частиц, загрязняющих поверхность очищаемого вещества. Все эти процессы обусловлены возникновением на поверхности раздела коллоидно- адсорбционных слоев. Поэтому моющие ПАВ должны быть хорошими эмульгаторами, обладать высокой поверхностной активностью и ярко выраженными коллоидными свойствами в водных растворах. За счет адсорбции молекул моющих средств на поверхности очищаемого вещества и на поверхности частиц грязи	3

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
			происходит их отрыв от очищаемой поверхности, т.е. пептизация и стабилизация. Частички грязи образуют стойкую водную эмульсию или суспензию, которая удаляется с загрязненной поверхности. Важную роль играет пенообразование, т.к. обильная и стойкая пена способствует механическому удалению загрязнений.	
11.	Задание комбинированного типа	Прочитайте текст, найдите соответствие и напишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Каким значениям ГЛБ соответствуют следующие эмульсии: 1) вода-масло; 2) масло-вода; 3) смачиватели; 4) моющие средства. а) 13-15; б) 3-6; в) 8-16; г) 7-9.	1 – б; 2- в; 3- г; 4- а. Понятие о ГЛБ является достаточно формальным, но оно позволяет определять области применения ПАВ. Так, для образования эмульсий вода-масло ГЛБ лежит в пределах 3-6, эмульсий масло-вода - 8-16, для смачивателей - 7-9, для моющих средств -13-15.	

Полный комплект оценочных материалов по дисциплине (модулю) (фонд оценочных средств) хранится в электронном виде на кафедре, утверждающей рабочую программу дисциплины (модуля).

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине

Текущий и внутрисеместровый контроль, промежуточная аттестация учебных достижений студентов проводится путем балльно-рейтинговой системы. Общая оценка

учебных достижений студента в семестре по учебному курсу определяется как сумма баллов, полученных студентом по различным формам текущего и промежуточного контроля в течение данного семестра. Итоговой формой отчетности является зачет в 10 семестре, поэтому балльная оценка является суммой баллов, полученных на различных формах текущего контроля и 10 баллов, включающих различного рода бонусы (отсутствие пропусков занятий, активная работа в течение семестра).

Таблица 10. Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине

№ п/п	Контролируемые мероприятия	Количество мероприятий/баллы	Максимальное количество баллов	Срок предоставления
Основной блок (90 баллов)				
1	Общие сведения о ПАВ. Классификация ПАВ.	Опрос Отчет по лабораторным работам. Решение задач	5 балла 5 балла 5 балла	По расписанию
2.	Области применения ПАВ.	Опрос Отчет по лабораторным работам	5 балла 5 балла	По расписанию
3	Синтез ПАВ.	Опрос Отчет по лабораторным работам	5 балла 5 балла	По расписанию
4	Поверхностно-активные вещества и проблемы аналитической химии. Методы определения ПАВ	Опрос Отчет по лабораторным работам Тест1	5 балла 5 балла 10 баллов	По расписанию
5	Гигиенические характеристики поверхностно-активных веществ	Опрос Отчет по лабораторным работам Решение задач	5 балла 5 балла 5 балла	По расписанию
6	Строение мицелл ПАВ. Поверхностные явления. Причины возникновения. Термодинамика поверхностных явлений. Поверхностное напряжение. Изотермы. Методы определения.	Опрос Отчет по лабораторным работам К.Р. №1	5 балла 5 балла 10 баллов	По расписанию
Всего			90	
Блок бонусов (10 баллов)				
7	Дополнение к ответам на семинарских занятиях	0,7 балла	5 баллов	В конце семестра
8	Активная работа студентов на занятиях	0,3 балла	2балла	В конце семестра
9	Отсутствие пропусков практических-семинарских и лабораторных занятий	0,4 балла	3балла	В конце семестра
ИТОГО			100 баллов	

Таблица 11. Система штрафов (для одного занятия)

Показатель	Балл
Опоздание (два и более)	Минус 2 балла
Не готов к практическо-семинарским и лабораторным занятиям	Минус 3 балла
Пропуск занятий без уважительной причины (за одно занятие)	Минус 2 балла
Нарушение учебной дисциплины	Минус 2 балла
Нарушение правил техники безопасности	Минус 1 балл

Таблица 12. Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр по дисциплине (модулю)

Сумма баллов	Оценка по 4-балльной шкале	
90–100	5 (отлично)	
85–89		
75–84	4 (хорошо)	
70–74		
65–69		
60–64	3 (удовлетворительно)	
Ниже 60	2 (неудовлетворительно)	Не зачтено

При реализации дисциплины (ПАВ) в зависимости от уровня подготовленности обучающихся могут быть использованы иные формы, методы контроля и оценочные средства, исходя из конкретной ситуации.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

1. Алыков, Н.М. Поверхностно-активные вещества и флокулянты в объектах окружающей среды. Методы концентрирования, определения и удаления: монография / Алыков, Н. М., Алыкова, Т.В., Шачнева, Е.Ю. ; ред. Н.М. Алыкова. Астрахань: Астраханский ун-т, 2011. 107 с. (М-во образования и науки РФ. АГУ).
 2. Джигола, Л. А. Поверхностно-активные вещества: учебно-методическое пособие / Л. А. Джигола. Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. 56 с.
 3. Холмберг К., Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах [Электронный ресурс] / К. Холмберг, Б. Йёнссон, Б. Кронберг, Б. Линдман ; пер. с англ. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2015. - 531 с.
- URL <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329427.html>

8.2. Дополнительная литература

1. Москвичев, Ю.А. Москвичев, Ю. А. Продукты органического синтеза и их применение: доп. УМО по образованию в области химической технологии и биотехнологии в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Химическая технология органических веществ и топлива" / Москвичев, Ю. А., Фельдблум, В. Ш. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 376 с.
2. Холмберг, К. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах / К. Холмберг [и др.]; пер. Г.П. Ямпольской; под ред. Б.Д. Сумма. М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 528 с.

3. Холмберг К., Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах [Электронный ресурс] / Холмберг К. -М. : БИНОМ, 2012. - 532 с. URL <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313396.html>

8.3. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины (модуля)

Перечень ЭБС и электронных ресурсов, предоставляемых Научной библиотекой АГУ на 2022/2023 учебный год, которые могут быть использованы для информационного обеспечения дисциплины:

1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-систем».

<https://library.asu.edu.ru>

2. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной генерации на электронной платформе ЭБС «Электронный читальный зал - БиблиоТех».

<https://biblio.asu.edu.ru>

*Учетная запись образовательного портала АГУ
(Регистрация в 905 аудитории. Пристой)*

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента». Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Каталог в настоящее время содержит около 15000 наименований.

www.studentlibrary.ru

Регистрация с компьютеров АГУ

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает в себя лабораторный практикум, аудиторию (лабораторию) для проведения практических занятий. Лабораторный практикум обеспечен химическими реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным оборудованием: весы аналитические и электронные, спектрофотометры ПЭ 5400, ПЭ2300; анализаторы жидкостей pH-метры «Эксперт-001», ионоселективные электроды, центрифуга ОПН-3 с ротором, магнитные мешалки, рефрактометр, термостат "ТС-80"М2, кондуктометр «Эксперт», Аквадистиллятор ДЭ-4(с ЗИПом), шкаф вытяжной ШВ-202 ПАОТ, малая раковина, КО1-04. Проведение практических занятий сопряжено с применением компьютеров для выполнения поисковой работы, вычислений и работе в информационных системах.

10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адаптирована для обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется заявление обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, или их законных представителей и рекомендации психолого-медицинской-педагогической комиссии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т. д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т. д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).